Инструкция по применению
Коделак бронхо с чабрецом Сироп 200мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

Действующее вещество

Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт

Состав

Состав на 5 мл сиропа: Действующие вещества: амброксола гидрохлорид - 10 мг, натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты) - 30 мг, тимьяна ползучего травы экстракт (чабреца экстракт жидкий*) (1:1) - 500 мг. Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат - 3,75 мг, пропилпарагидроксибензоат - 1,25 мг, сорбитол - 3000 мг, натрия гидроксида раствор 2,4 % ** - до pH 6,5, вода очищенная - до 5 мл. * Чабреца экстракт жидкий, получаемый из травы дикорастущего полукустарника тимьяна ползучего (чабреца) - Thymus serpyllum L., сем. яснотковых - Lamiaceae, экстракцией спиртом 30 %, содержащим глицерин. ** Натрия гидроксида раствор 2,4 % готовят из натрия гидроксида и воды очищенной.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Амброксол. После приема внутрь амброксол быстро и практически полностью абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови при пероральном приеме достигается через 1-3 ч. Объем распределения составляет 552 л. В терапевтическом интервале концентраций связывание с белками плазмы составляет 80-90 %. Самые высокие концентрации активного компонента препарата наблюдаются в легких. амброксол проникает через плацентарный и гематоэнцефалический барьеры, выделяется с грудным молоком. Примерно 30 % принятой пероральной дозы подвергается эффекту первичного прохождения через печень. Исследования на микросомах печени человека показали, что изофермент CYP3A4 является преобладающей изоформой, ответственной за метаболизм амброксола до дибромантраниловой кислоты. Оставшаяся часть амброксола метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием фармакологически неактивных метаболитов. Терминальный период полувыведения (T1/2) амброксола из плазмы крови составляет 10 часов. Общий период полувыведения амброксола и его метаболитов составляет около 22 ч. Выводится почками: 90 % в виде метаболитов, 10 % в неизмененном виде. Не обнаружено клинически значимого влияния возраста и пола на фармакокинетику амброксола, поэтому нет оснований для подбора дозировки по этим признакам. Натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты). После перорального приема, в кишечнике под влиянием фермента &beta,-глюкуронидазы, продуцируемого бактериями нормальной микрофлоры, из глицирризиновой кислоты образуется активный метаболит. &beta,-глицирретовая кислота, которая всасывается в системный кровоток. В крови &beta,-глицирретовая кислота связывается с альбумином и практически полностью транспортируется в печень. Выделение &beta,-глицирретовой кислоты происходит преимущественно с желчью, в остаточном количестве - с мочой. Экстракт травы тимьяна ползучего (чабреца). Действие препарата является результатом совокупного действия активных веществ экстракта травы тимьяна ползучего (чабреца), поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным, все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания

Заболевания дыхательных путей с образованием вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктатическая болезнь.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время приема пищи, с небольшим количеством воды. Взрослым и детям старше 12 лет - по 10 мл 4 раза в сутки. Детям от 2 до 6 лет назначают по 2,5 мл сиропа 3 раза в сутки, от 6 до 12 лет - по 5 мл 3 раза в сутки. Максимальная продолжительность лечения без консультации врача - 5 дней. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появ ляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 2 лет, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Коделак, Бронхо с чабрецом, сироп противопоказано при беременности. В случае необходимости приема препарата в период грудного вскармливания, кормление грудью следует прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции. Редко - слабость, головная боль, диарея, сухость во рту и дыхательных путях, экзантемы, ринорея, запор, дизурия. При длительном приеме в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, диспепсия. Лечение: искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 часа после приема препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение с противокашлевыми лекарственными средствами приводит к затруднению отхождения мокроты. При одновременном применении с амоксициллином, цефуроксимом, эритромицином, доксициклином амброксол увеличивает их проникновение в бронхиальный секрет.

Особые указания

Не комбинировать с противокашлевыми средствами. Пациентам с сахарным диабетом возможно использование препарата с учетом содержания сорбита в количестве 0,18 ХЕ в 5 мл сиропа. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 0,24 грамма, в максимальной суточной дозе препарата - 0,96 грамм. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флаконе). Хранить в недоступном для детей месте.