Инструкция по применению
Кофанол Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Наброс Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная, от красно-оранжевого до красно-коричневого цвета, вязкая жидкость с характерным запахом

Состав

Каждые 5 мл сиропа содержат активные вещества: Аммония хлорид - 138 мг Левоментол - 1,14мг Дифенгидрамина гидрохлорид - 14,08 мг Натрия цитрат - 57,03 мг Вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, натрия сахаринат, сахар (сахароза), раствор декстрозы*, ароматизатор малиновый, краситель пунцовый /Понсо 4R/ (E 124), метилпарагидроксибензоат натрия, пропилпарагидроксибензоат натрия. *содержит декстрозу, олиго- и полисахариды, получаемые гидролизом крахмала.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Препарат предназначен для облегчения симптомов простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозы

Если не предписано иначе, то рекомендуемые дозы следующие: взрослые: две чайные ложки сиропа (10 мл) два раза в день (утром и вечером), дети старше 12 лет: одна чайная ложка (5 мл) два-три раза в день. Длительный прием препарата (в течение 2-3 недель) только по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, стенозирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, стеноз шейки мочевого пузыря, бронхиальная астма, беременность и период лактации, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), средств, угнетающих центральную нервную систему, алкоголя, детский возраст до 12 лет.

Побочные действия

Возможны сонливость, повышенная утомляемость, чувство слабости, головокружение, головная боль, сухость во рту, носу и горле, повышенная нервная возбудимость. Диспепсические расстройства: тошнота, рвота, диарея, потеря аппетита.

Передозировка

Возможно усиление побочного действия. В подобных случаях следует незамедлительно проконсультироваться с врачом. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении Кофанол усиливает действие средств, угнетающих центральную нервную систему, таких как алкоголь, ингибиторы МАО (включая фурозолидон и прокарбазин), анксиолитики, седативные и снотворные средства. Средства, способные оказывать ототоксичные эффекты: одновременный прием с антигистаминными средствами (к которым относится дифенгидрамин, входящий в состав препарата) может скрывать симптомы ототоксичности, например шум в ушах, головокружение. Одновременный прием фотосенсибилизирующих и антигистаминных средств может вызывать дополнительную повышенную чувствительность к воздействию солнечного света.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:С осторожностью следует назначать препарат пациентам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрой скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре ниже 25 °С.