Инструкция по применению
Кофасма Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Аджио Фармасьютикалз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол
Количество в упаковке: 1

Описание

Комбинированный препарат, оказывает бронхолитическое, отхаркивающее и муколитическое действие.

Действующее вещество

Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол

Форма выпуска

Сироп

Показания

В составе комбинированной терапии острых и хронических бронхо-легочных заболеваний, сопровождающихся образованием трудно отделяемого вязкого секрета: - бронхиальная астма. - острый и хронический бронхит. -эмфизема легких. - хроническая обструктивная болезнь легких. - трахеобронхит. - пневмония. - пневмокониоз. - туберкулез легких. - коклюш.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет назначают по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза /сут. Детям в возрасте до 6 лет - по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза/сут, от 6 до 12 лет - по 5-10 мл (1-2 чайные ложки) 3 раза/сут.

Противопоказания

- фенилкетонурия. - тахиаритмия- миокардит. - тахикардия. - пороки сердца (в т. ч. аортальный стеноз). - декомпенсированный сахарный диабет. - тиреотоксикоз. - глаукома. - печеночная и/или почечная недостаточность. - язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения). - желудочное кровотечение. - беременность. - период лактации. - повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение данного препарата во время беременности и период лактации.

Побочные действия

Со стороны центральной нервной системы: тремор рук, мышечные судороги. При применении в высоких дозах - головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сопливость. Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, повышение активности "печеночных" трансаминаз. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, снижение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс. Со стороны мочевыводящей системы: окрашивание мочи в розовый цвет. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, парадоксальный бронхоспазм.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление проявлений описанных побочных эффектов. Лечение: при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении бета-адреномиметики и теофиллин и др. ксанатины повышают вероятность развития тахиаритмий. Не рекомендуется назначать с ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами, т. к. они усиливают действие сальбутамола, могут привести к резкому снижению артериального давления. Несовместим с неселективными бета-адреноблокаторами. Диуретики и глюкокортикостероиды усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола. Не назначают одновременно с препаратами, содержащими кодеин и др. противокашлевыми средствами (затрудняет отхождение мокроты). Входящий в состав препарата бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань.

Особые указания

Гвайфенезин окрашивает мочу в розовый цвет. Не рекомендуется принимать одновременно с препаратом щелочное питьё.