Инструкция по применению
Колбиоцин Мазь глазная 5 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Италия
Производитель: НОВАМЕДИКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Колистиметат натрия+Ролитетрациклин+Хлорамфеникол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Колистиметат натрия+Ролитетрациклин+Хлорамфеникол

Состав

Мазь глазная полутвердая, желтого цвета. 1 гхлорамфеникол10 мгколистиметат натрий180 тыс.МЕтетрациклин5 мг Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, ланолин, вазелин глазной.

Форма выпуска

Мазь

Показания

конъюнктивиты (катаральный, гнойный, трахомный); блефариты; блефароконъюнктивиты; бактериальные кератиты; септическая язва роговицы; дакриоцистит.

Способ применения и дозы

Глазную мазь следует закладывать в нижний конъюнктивальный мешок 3-4 раза/сут. Если применение мази сочетается с использованием глазных капель, то мазь можно применять только 1 раз/сут (перед сном).

Противопоказания

индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата; нарушение функции печени, почек; беременность; период лактации; детский возраст (до 8 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Местные реакции: кратковременная гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения. Аллергические реакции: ангионевротический отек, крапивница, буллезный и пятнисто-папулезный дерматит.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Колбиоцин не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Колбиоцин с другими препаратами для местного применения не описано.

Особые указания

При отсутствии существенного клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или при появлении аллергических реакций Колбиоцин следует отменить и провести соответствующую противоаллергическую терапию. Т.к. были зарегистрированы редкие случаи гипоплазии костного мозга вследствие длительного местного применения хлорамфеникола, Колбиоцин следует применять в течение коротких промежутков времени и под наблюдением офтальмолога.

Срок хранения после открытия

15 дней.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. После вскрытия препарат хранить в холодильнике при t 2–8 °C.