Инструкция по применению
Колдакт Бронхо Сироп 60 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол+Хлорфенамина малеат+Фенилэфрина гидрохлорид+Гвайфенезин
Количество в упаковке: 1

Описание

Густой раствор от светло-оранжевого до оранжевого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Амброксол+Хлорфенамина малеат+Фенилэфрина гидрохлорид+Гвайфенезин

Состав

Каждые 10 мл сиропа содержат: Действующие вещества: Амброксола гидрохлорид 15,00 мг Хлорфенамина малеат 2,00 мг Гвайфенезин 100,00 мг Фенилэфрина гидрохлорид 5,00 мг Вспомогательные вещества: сахароза 4000,00 мг, метилпарагидроксибензоат 18,00 мг, пропилпарагидроксибензоат 2,00 мг, динатрия эдетат 2,00 мг, сорбитол 70% раствор 1000,00 мг, глицерин (глицерол) 500,00 мг, ментол 1,00 мг, лимонной кислоты моногидрат 2,00 мг, натрия цитрат 5,00 мг, ароматизатор дыни (H 32734) 0,03 мл, краситель солнечный закат желтый FCF (E 110) 0,66 мг, вода очищенная q.s. до 10 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическое лечение «простудных» заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой вязкой мокротой.

Способ применения и дозы

Перед применением взбалтывать! Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет: 20 мл (4 чайные ложки) 3 раза в день. Рекомендуемая доза для детей 6-12 лет: 10 мл (2 чайные ложки) 2-3 раза в день. Прием препарата следует равномерно распределить в течение всего дня.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, одновременный прием других препаратов, содержащих вещества, входящие в состав Колдакт® Бронхо, одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов, судороги любой этиологии, выраженный атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет, тиреотоксикоз, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, аденома предстательной железы, дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 6 лет), дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галакгозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных по применению препарата Колдакт® Бронхо при беременности и в период грудного вскармливания нет.

Побочные действия

Возможны подъем артериального давления, тахикардия, головная боль, появление сонливости, головокружение, сухость слизистых оболочек, ухудшение аппетита, затруднение мочеиспускания, аллергические реакции в виде сыпи и зуда, крапивницы, отека Квинке, тошнота, рвота, запор, диарея, боли в эпигастральной области, повышенная возбудимость, нарушение засыпания, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, феохромоцитома. У детей возможно возникновение возбуждения, беспокойства и раздражительности. У пожилых пациентов возможны также спутанность сознания или раздражительность.

Передозировка

Усиление выраженности побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, слабительные средства (вазелиновое масло, солевые слабительные), симптоматическая терапия. При выраженных нарушениях необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие седативных средств, этанола. Совместное применение с антидепрессантами, фенотиазиновыми производными (хлорпромазин, трифлуоперазин, левомепромазин), противопаркинсоническими и антипсихотическими средствами повышает риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров, с глюкокортикостероидами (преднизолон, дексаметазон, триамцинолон) увеличивает риск развития глаукомы. Хлорфенамин при применении одновременно с ингибиторами МАО (ниаламид), фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению, гиперпирексии. Применение совместно с трициклическими антидепрессантами усиливает их симпатомиметическое действие, с галотаном повышает риск развития желудочковой аритмии, с гуанетидином снижает его гипотензивное действие, который, в свою очередь, усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина. Одновременное применение амброксола и гвайфенезина с противокашлевыми средствами приводит к затруднению отхождения мокроты.

Условия хранения

При температуре не выше 25 оС. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.