Инструкция по применению
Колдфри Таблетки 9 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Русюрофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол+Хлорфенамина малеат+Кофеин+Фенилэфрина гидрохлорид
Количество в упаковке: 9
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Парацетамол+Хлорфенамина малеат+Кофеин+Фенилэфрина гидрохлорид

Состав

Таблетки - 1 таб.: Таблетки дневные: Парацетамол - 500 мг, Хлорфенамина малеат - 2 мг, Фенилэфрина гидрохлорид - 5 мг, Кофеин безводный - 15 мг. Таблетки ночные: Парацетамол - 500 мг, Хлорфенамина малеат - 4 мг, Фенилэфрина гидрохлорид - 10 мг. Вспомогательные вещества: Таблетки дневные: крахмал кукурузный, повидон, желатин, магния стеарат, краситель железа оксид желтый, краситель хинолиновый желтый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат. Таблетки ночные: крахмал кукурузный, повидон, желатин, магния стеарат, краситель бриллиантовый голубой, краситель хинолиновый желтый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат. По 6 "дневных" таблеток и 3 " ночных" таблетки в блистер из фольги алюминиевой и ПВХ. По 1 блистеру укладывают в пачку вместе с инструкцией по применению.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Симптоматическое лечение «простудных» заболеваний, гриппа, ОРВИ: лихорадочный синдром, болевой синдром, ринорея.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по одной дневной таблетке утром и днем, одну ночную таблетку на ночь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Колдфри; артериальная гипертензия; гипертиреоз; гипертрофия предстательной железы; беременность и лактация; возраст до 12 лет; одновременный прием препаратов, содержащих парацетамол.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Чувство тревоги, тремор, сонливость, головокружение, головная боль, раздражительность, бессонница, слабость; сердцебиение, повышение артериального давления; снижение аппетита, тошнота, рвота; задержка мочи; аллергические реакции; при длительном применении, особенно в больших дозах, возможно развитие метгемоглобинемии, анемии, нефротоксического и гепатотоксического действия.

Передозировка

Симптомы: сухость во рту, учащение пульса, аритмии, потливость, тошнота, рвота, боли в животе, повышенная активность (перевозбуждение), галлюцинации, острая печеночная и/или почечная недостаточность. Лечение: промывание желудка, внутривенное введение ацетилцистеина или метионина, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат может усиливать эффекты ингибиторов МАО (моноаминооксидазы), трициклических антидепрессантов, седативных препаратов, этанола и этанолсодержащих препаратов. Этанол стимулирует метаболизм парацетамола. При одновременном применении парацетамола с азидотимидином возможно развитие нейтропении. При одновременном применении с хлорамфениколом парацетамол повышает его токсичность. Препараты, стимулирующие активность микросомальных изоферментов, усиливают гепатотоксическое действие парацетамола.

Особые указания

Влияние на способность к управлению транспортными средствами или потенциально опасными механизмами. В связи с возможным развитием сонливости во время лечения препаратом не рекомендуются виды работ, требующие повышенного внимания и высокой скорости псхомоторных реакций. В период лечения необходимо избегать употребления алкоголя.

Условия хранения

Беречь от детей