Инструкция по применению
Колдрекс таблетки 12 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Ирландия
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Терпингидрат+Аскорбиновая кислота
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 500 мг+25 мг+5 мг+20 мг+30 мг
Срок годности: 48

Действующее вещество

Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Терпингидрат+Аскорбиновая кислота

Состав

Парацетамол 500 мг кофеин 25 мг фенилэфрина гидрохлорид 5 мг терпингидрат 20 мг Аскорбиновая кислота 30 мг Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 103.5 мг, крахмал прежелатинизированный - 30 мг, тальк - 12.47 мг, стеариновая кислота - 6.24 мг, повидон - 4 мг, калия сорбат - 0.8 мг, натрия лаурилсульфат - 0.8 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) - 0.4 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Колдрекс не предоставлены.

Показания

Устранение симптомов простудных заболеваний и гриппа, таких как: — повышенная температура; — головная боль; — озноб; — боль в суставах и мышцах; — ощущение заложенности носа; — боли в пазухах носа и в горле.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2 таб. до 4 раз/сут. Детям в возрасте 6-12 лет - по 1 таб. до 4 раз/сут. Нельзя превышать рекомендуемую дозу. Препарат не рекомендуется применять более 5 дней без консультации с врачом. Если симптомы сохраняются, следует обратится к врачу.

Противопоказания

— генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы; — заболевания системы крови; — тяжелые нарушения функции печени или почек; — тиреотоксикоз; — сахарный диабет; — артериальная гипертензия; — одновременный прием с другими парацетамолсодержащими препаратами; — повышенная чувствительность к ингредиентам, входящим в состав препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью и только после консультации с врачом можно принимать препарат при беременности и в период лактации.

Побочные действия

В рекомендованных дозах препарат обычно хорошо переносится. Парацетамол редко оказывает побочное действие. Иногда: аллергические реакции, например, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек. Редко: нарушения картины крови. При длительном применении с превышением рекомендованной дозы может наблюдаться гепатотоксическое и нефротоксической действие. Фенилэфрин может вызывать: Со стороны пищеварительной системы: тошнота, Со стороны сердечно-сосудистой системы: головная боль, незначительное повышение АД и в редких случаях сердцебиение, которые проходят после отмены препарата.

Передозировка

В случае передозировки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, даже при хорошем самочувствии. Симптомы: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, сердечные аритмии. Через 1-2 суток могут определяться признаки поражения печени. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность и коматозное состояние. Лечение: сделать промывание желудка в течение первых 4 ч после приема препарата, далее проводить симптоматическую терапию. Специфическим антидотом при отравлении парацетамолом является ацетилцистеин.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует принимать одновременно с трициклическими антидепрессантами, бета-адреноблокаторами, ингибиторами МАО и в течение 14 дней после их отмены. Риск развития гепатотоксического действия повышается при одновременном приеме барбитуратов, дифенина, карбамазепина, рифампицина, зидовудина и других индукторов микросомальных ферментов печени. Метоклопрамид и домперидон повышают скорость всасывания парацетамола, а колестирамин - снижает.

Особые указания

Избыточное употребление чая или кофе во время приема препарата Колдрекс может вызвать раздражительность и нервное напряжение. Во избежание токсического поражения печени пациентам, принимающим препарат Колдрекс, следует воздерживаться от употребления алкоголя. Не рекомендуется назначать препарат при хроническом алкоголизме. Использование в педиатрии Без консультации врача нельзя применять препарат у детей до 6 лет.

Условия хранения

В сухом месте