Инструкция по применению
Venoteks Колготки компрессионные 1 класс р. L бежевые арт. 1С402

Характеристики

Форма выпуска: Колготки
Страна: Германия
Производитель: ГМБХ Рехард технологии
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Мягкий и шелковистый трикотаж для женщин, которые ценят уют и комфорт. За счет высокого содержания микрофибры (55% микроволокон нейлона) колготки идеально подходят для холодного времени года, удобны в использовании и обладают повышенной износостойкостью.Колготки имеют специальную растяжимую вставку в области живота и широкую резинку, которая комфортно фиксирует колготки на уровне выше талии.Колготки Venoteks COMFORT для беременных предотвращают усталость и тяжесть в ногах, уменьшают болевые ощущения. Особенно они подойдут женщинам со статическими нагрузками (кто много сидит или стоит на работе) и без выраженных отеков ног.1 класс компрессии15-21 мм рт. ст.Преимущества мягкие и шелковистые колготки с микрофиброй можно носить в холодное время года, они хорошо сохраняют тепло и создают комфорт, материал «микрофибра» обеспечивает легкость надевания и придает повышенную износостойкость, благородный полуматовый оттенок полотна помогает маскировать косметические дефекты на ногах и делает женский образ элегантным, удобная эластичная вставка в области живота создает комфорт ношения в течение дня, укрепленная носочно-пяточная часть продлевают срок носки изделия.

Состав

77% нейлон (из них 61% в виде микрофибры) и 23% эластан.

Форма выпуска

Колготки

Показания

Наследственная предрасположенность к варикозной болезни. Начальная форма хронической венозной недостаточности, когда при отсутствии внешних признаков варикозного расширения вен появляются отеки и тяжесть в ногах к вечеру (след от резинки носков). Синдром «тяжелых ног»: тяжесть, боль, судороги, чувство онемения, «мурашек» и распирания в ногах к вечеру. Ретикулярный варикоз в виде выраженного сосудистого рисунка на коже ног. Наличие телеангиоэктазий (сосудистые «звездочки») на коже ног. Профилактика варикоза и улучшение плацентарного кровообращения у беременных.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев.Рекомендации по уходу: рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей не тереть и не выжимать изделие после стирки тщательно прополоскать бандаж сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Противопоказания

Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Диабетическая полинейропатия и ангиопатия. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбоэмболией) (индекс ABPI > 1.2 или индекс ABPI Трофические язвы не венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит. Местные кожные заболевания ног. Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа. Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).