Инструкция по применению
Колломак Раствор для наружного применения 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Египет
Производитель: Октобер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Салициловая кислота+Молочная кислота+Полидоканол 600
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Салициловая кислота+Молочная кислота+Полидоканол 600

Состав

10 г раствора для наружного применения содержат: Действующие вещества: 2,0 г салициловой кислоты, 0,5 г молочной кислоты, 0,2 г полидоканола 600.
Вспомогательные вещества: дибутилфталат 0,10 г, этилцеллюлоза 0,55 г, ацетон 6,65 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Бородавки, мозоли, омозолелости, ороговение кожи, остроконечные кондиломы (в том числе классические уплощенные и гигантские кондиломы Бушке-Ливенштейна), гиперкератоз при псориазе (в том числе ладонно-подошвенный).

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, то следует наносить на пораженные участки кожи одну каплю Колломака 1-2 раза в день. У взрослых можно применять в течение одного дня не более 2,0 г салициловой кислоты, что сооответствует 10,0 мл Колломака. У детей не допускается превышение суточной дозы салицилата, составляющей 0,2 г салициловой кислоты, что соответствует 1,0 мл Колломака. При лечении детей не следует обрабатывать несколько участков кожи одновременно. Продолжительность лечения: Как правило, через 3-4 дня удается удалить мозоли и омозолелости после принятия теплой ножной ванны. При использовании максимально допустимой суточной дозировки (10,0 мл у взрослых и 1,0 мл у детей) длительность лечения не должна превышать 1 недели. Длительность лечения устанавливается в соответствии с полученными результатами.

Противопоказания

Не следует применять у младенцев, а также наносить на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки в области гениталий или лица. Повышенная чувствительность к салициловой кислоте или другим компонентам препарата. Не следует применять у пациентов с нарушениями функции почек (почечной недостаточностью). У этих пациентов применение препаратов, содержащих салицилаты, возможно только при соблюдении особых условий и с особой осторожностью.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности применение Колломака допустимо только при нанесении его на ограниченную поверхность (не более 5 см2). При использовании Колломака в соответствии с показаниями допустимо продолжение грудного кормления в ходе лечения. Только следует избегать случайного приема младенцем препарата внутрь путем контакта с обработанными поверхностями тела.

Побочные действия

Изредка возможно местное раздражение кожи (жжение и покраснение). В отдельных случаях возможно развитие кожных аллергических реакций при контакте с препаратом.

Передозировка

При наружном применении препаратов салициловой кислоты обычно не следует ожидать развития токсических побочных действий даже в случае непреднамеренного кратковременного превышения указанных максимальных дозировок. Возможно появление местного раздражения кожи. В качестве меры противодействия достаточно удалить препарат. В случае непреднамеренного проглатывания препарата необходимо немедленно промыть рот большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств местного применения и тем самым усилить их поступление в организм, а также усилить нежелательное действие метотрексата и сахаропонижающее действие пероральных противодиабетических препаратов типа сульфанилмочевины.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.