Инструкция по применению
Колофорт Таблетки для рассасывания 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Антитела к фактору некроза опухоли альфа аффинно очищенные
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись KOLOFORT.

Действующее вещество

Антитела к фактору некроза опухоли альфа аффинно очищенные

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Колофорт® показан к применению у взрослых. Синдром раздраженного кишечника, в том числе связанный со стрессом, проявляющийся такими симптомами, как абдоминальная боль, запор, диарея, метеоризм, вздутие, тошнота и рвота. Функциональная диспепсия, проявляющаяся тошнотой, рвотой, вздутием живота, спастическими болями в животе, чувством раннего насыщения, изжогой/отрыжкой кислым.

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части. Внутрь. На один прием – по 2 таблетки (держать во рту до полного растворения – не во время приема пищи). Принимать 2 раза в день. Синдром раздраженного кишечника Курс лечения не менее 1 месяца, рекомендуемый курс лечения – 3 месяца, при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев и/или повторить через 1-2 месяца. Функциональная диспепсия Рекомендуемый курс лечения – 2 месяца.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Дефицит лактазы, наследственная непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Данные о применении действующих веществ препарата Колофорт® у беременных женщин отсутствуют. Период грудного вскармливания Сведения о проникновении действующих веществ (метаболитов) препарата Колофорт® в грудное молоко человека отсутствуют.

Особые указания

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат.

Условия хранения

В сухом месте