
Инструкция по применению
Комплинекс Иммуно Капсулы 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 14
Срок годности: 2.0



Описание

КОМПЛИНЕКС - это пробиотический комплекс изученных бактерий Lactobacillus rhamnosus GG в доказано эффективной концентрации, дополненных витаминами группы В и минералом цинк, которые необходимы для поддержки организма в периоды повышенной нагрузки на иммунитет во время восстановления после острых кишечных расстройств или перенесенных инфекций, в сезон простудных заболеваний, при смене климата, эмоциональных и физических нагрузках.

Состав

Одна капсула содержит Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) - не менее 1 х 1010 КОЕ, мальтодекстрин (наполнитель) - не более 57,015 мг, цинка глюконат - 23,750 мг, витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 0,535 мг, витамин В2 (рибофлавин) - 0,500 мг, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 0,486 мг, [гидроксипропилметилцеллюлоза (носитель Е 464), полисахарид, титана диоксид (краситель Е 171) (оболочка капсулы).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется детям старше 6-ти лет и взрослым в качестве биологически активной добавки к пище - источника пробиотических лактобактерий Lactobacillus rhamnosus GG, витаминов В1 (тиамина), В2 (рибофлавина), В6 (пиридоксина) и цинка.

Способ применения и дозы

Детям старше 6-ти лет и взрослым - по 1-2 капсулы в сутки во время еды. Прием БАД при беременности и в период лактации осуществляется только по рекомендации и под наблюдением врача. Не смешивать с горячими напитками. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. При одновременном назначении с антибиотиками принимать КОМПЛИНЕКС не ранее, чем через 3 часа после применения антибиотиков. Продолжительность приема не менее 14 дней. Возможен повторный прием в течение года.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД к пище. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением у детей рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном назначении с антибиотиками принимать КОМПЛИНЕКС не ранее, чем через 3 часа после применения антибиотиков.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством. Прием БАД при беременности и в период лактации осуществляется только по рекомендации и под наблюдением врача. Не смешивать с горячими напитками. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, беречь от детей.