Инструкция по применению
КОМПЛИВИТ АКТИВ БАД ТАБЛ. N60

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Действие БАД «Компливит® Актив» обусловлено свойствами входящих в состав компонентов. Комплекс витаминов и минералов, являющихся важными факторами полноценного физического и интеллектуального развития ребенка, укрепления иммунитета, усиления адаптационных возможностей организма. Сбалансирован с учетом рекомендуемых уровней потребления микронутриентов. Витамин А необходим для иммунной защиты организма ребенка, повышает барьерную функцию слизистых оболочек, повышает сопротивляемость организма к вирусным и бактериальным инфекциям. Принимает участие в повышении сопротивляемости организма к инфекциям. Участвует в синтезе зрительных пигментов, необходим для сумеречного и цветового зрения. Необходим для формирования и роста костей, для здорового состояния кожи, зубов, волос. Является антиоксидантом. Витамин Е обладает выраженными антиоксидантными свойствами, способствует укреплению иммунитета и повышению защитных сил организма. Оказывает положительное влияние на функции нервной и мышечной ткани, участвует в процессах кроветворения. При недостатке в организме витамина Е повышаются подверженность инфекционным заболеваниям, риск воспалительных процессов, появляется мышечная слабость. Витамин С играет важную роль в работе иммунной системы, способствуя повышению устойчивости организма к инфекциям; обеспечивает синтез коллагена; участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; участвует в созревании эритроцитов, в регенерации тканей. Витамин С способствует поддержанию в здоровом состоянии кожи, снижает воспалительные реакции. Обладает выраженными антиоксидантными свойствами, нормализует

проницаемость капилляров. Витамин B1 способствует нормализации работы нервной и сердечно-сосудистой систем, способствует повышению иммунной защиты организма, предупреждает развитие физической и психической утомляемости. Витамин B2 участвует в белковом, углеводном и жировом обменах, синтезе гемоглобина, поддерживает зрительную функцию. При недостатке витамина B2 характерны появление трещин на губах и в углах рта, конъюнктивит. Витамин B6 необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, улучшает переносимость психоэмоциональных нагрузок, уменьшает раздражительность, повышает умственную работоспособность; облегчает адаптацию организма в условиях стресса. Витамин B3 (никотинамид) участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена. Недостаточность витамина B3 в организме характеризуется нарушениями стула, дерматитами и психическими расстройствами. Витамин B5 участвует в углеводном и жировом обмене, имеет важное значение для процессов роста, способствует построению, регенерации кожных покровов и слизистых, участвует в передаче нервных импульсов. Проявляться недостаточность витамина B5 может дерматитами, желудочно-кишечными расстройствами, мышечной слабостью, нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Витамин B12 является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток, повышает способность тканей к регенерации; необходим для функционирования центральной нервной системы ребенка; снижает риск развития анемии и хронической усталости. Фолиевая кислота (B9) принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, необходима для процессов кроветворения, улучшает регенерацию поврежденных тканей. Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в организме, обеспечивает их лучшее усвоение, необходим для формирования опорно-двигательного аппарата ребенка. При его недостатке снижается сила и тонус мышц, повышается риск развития рахита. Способствует формированию и минерализации костной ткани и ткани зубов. Играет важную роль в работе иммунной системы, способствуя повышению устойчивости организма к инфекциям. Железо поддерживает функционирование иммунной системы, необходимо для процессов кроветворения, умственного развития, работы желудочно-кишечного тракта. Дефицит железа может приводить к анемии, повышенной утомляемости, снижению работоспособности. Медь способствует антиоксидантной защите клеток, участвует в синтезе коллагена, предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует укреплению костей. Укрепляет стенки сосудов. Цинк укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, способствует усвоению витамина A, регенерации кожи и росту волос, необходим для нормального роста и развития ребенка. Улучшает защитную способность иммунной системы. Магний уменьшает возбудимость нервных клеток, оказывает успокаивающее действие. Принимает участие в формировании мышечной

и костной тканей, а также в синтезе белка и в энергетическом обмене. Облегчает проявления нервного напряжения, предотвращает судорожное сокращение мышц. Селен оказывает антиоксидантное действие, снижает воздействие на организм неблагоприятных факторов внешней среды (неблагоприятной экологии, стрессов, химических канцерогенов, радиации), способных усиливать образование свободных радикалов, разрушающих клеточные мембраны; оказывает защитное действие при поступлении в организм тяжелых металлов. В сочетании с витаминами А, Е и С улучшает адаптационные возможности организма в условиях воздействия экстремальных факторов. Способствует креплению иммунитета. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые регулируют интенсивность энергетического обмена, активно влияют на психическое и физическое состояние и развитие ребенка, состояние центральной нервной системы. Недостаток йода снижает активность иммунной защиты организма, негативно влияет на физическое развитие и способность к обучению. Кальций необходим для формирования костной ткани и минерализации зубов, проведения нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, для системы свертывания крови, поддержания стабильности сердечной деятельности. Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, входит в состав фосфолипидов, участвует в формировании и укрепляет костную ткань и зубы, усиливает их минерализацию. Дефицит может приводить к анорексии, анемии, рахиту. Марганец необходим для нормального роста, обмена веществ, процессов развития и укрепления костной и хрящевой тканей. Участвует в иммунных реакциях. Рутин обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает окисление аскорбиновой кислоты. Рутин и витамин С укрепляют сосудистую стенку, уменьшают ломкость капилляров. Уменьшает проницаемость сосудов.

Состав

На одну таблетку: Витамин А (ретинола ацетат) - 0,7912 мг (2300 МЕ) Витамин Е (α-токоферола ацетат) - 10,00 мг Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 1,00 мг Витамин В2 (рибофлавин) - 1,00 мг Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 1,50 мг Витамин С (аскорбиновая кислота) - 50,00 мг Никотинамид - 7,50 мг Фолиевая кислота - 0,2 мг Рутин (рутозид) -10,00 мг Кальция пантотенат - 5,00 мг Витамин В12 (цианокобаламин) - 0,003 мг Эргокальциферол - 0,0025 мг (100 МЕ) Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 27,00 мг Железо (в виде железа фумарата) - 10,00 мг Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) - 1,00 мг Медь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 1,00 мг Цинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 5,00 мг Магний (в виде магния оксида) - 22,00 мг Кальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 35,00 мг Селен (в виде натрия селенита) - 0,01 мг Йод (в виде натрия йодида) - 0,10 мг Фтор (в виде натрия фторида) - 0,50 мг Вспомогательные вещества: тальк - 2,20 мг, крахмал картофельный - 133,0 мг, лимонной кислоты моногидрат - 16,63 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,75 мг, кальция стеарат - 6,78 мг, стеариновая кислота - 4,54 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар-песок) 119,1995 мг. Состав оболочки: гипролоза (гидрокси-пропилцеллюлоза) - 8,395 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,197 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,71 мг, титана диоксид - 5,703 мг, тальк - 5,776 мг, индигокармин - 0,044 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,175 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

БАД к пище «Компливит® Актив» является дополнительным источником витаминов А, С, Е, D , группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевой кислоты), минеральных элементов (железа, меди, цинка, селена, йода, марганца), содержащей магний. Восполняет недостаток витаминов и минералов. Компоненты комплекса необходимы для поддержки организма ребенка в период интенсивного роста и развития, при физических и умственных нагрузках, для повышения устойчивости организма к инфекциям, для поддержки нервной системы в период адаптации к школе, поддержки памяти и интеллекта ребенка.

Способ применения и дозы

Детям в возрасте с 7 до 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, нарушение углеводного обмена, сахарный диабет, избыточная масса тела, состояния, при которых противопоказаны препараты йода.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При многократном превышении терапевтической дозы возможно возникновение рвоты, диареи, мышечной слабости, обусловленных гипервитаминозом витаминов А и D3. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций, поэтому замедляет всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолонов.При одновременном применении аскорбиновой кислоты и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии.Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа.При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность развития гиперкальциемии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.