
# Инструкция по применению
# Компливит Таблетки покрытые пленочной оболочкой массой 890 мг 60 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24




## Описание

Таблетки двояковыпуклой продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой белого цвета.

**Состав**

Ретинола ацетат (вит. А) - 1,135 мг (3300 МЕ) # -токоферола ацетат (вит. Е) - 10 мг Аскорбиновая кислота (вит. С) - 50 мг Тиамина гидрохлорид (вит. В1) - 1 мг Рибофлавина мононуклеотид (вит. В2) - 1,27 мг Кальция пантотенат - 5 мг Пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) - 5 мг Фолиевая кислота - 100 мкг Цианокобаламин (вит. В12) - 12,5 мкг Никотинамид - 7,5 мг Рутозид (рутин) - 25 мг Тиоктовая (липоевая) кислота - 2 мг Кальций (в форме кальция фосфата дигидрата) - 50,5 мг Магний (в форме магния гидроортофосфата тригидрата) - 16,4 мг Фосфор (в форме магния гидрофосфата Тригидрата и кальция фосфата дигидрата) - 60 мг Железо (в форме железа сульфата гептагидрата) - 5 мг Медь (в форме меди сульфата пентагидрата) - 750 мкг Цинк (в форме цинка сульфата гептагидрата) - 2 мг Марганец (в форме марганца сульфата моногидрата) - 2,5 мг Кобальт (в форме кобальта сульфата гептагидрата) - 100 мкг Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая, тальк, крахмал картофельный, лимонная кислота, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный), кальция октадеканоат (кальция стеарат), сахароза (сахар), мука пшеничная, магния гидроксикарбонат (магний углекислый основной водный), желатин, титана диоксид, воск пчелиный.

**Форма выпуска**

Таблетки

**Показания**

* Профилактика и восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ, * Повышенные физические и умственные нагрузки, * Период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний в том числе инфекционных, * В комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии.

**Способ применения и дозы**

Принимают внутрь после еды. Для профилактики витаминно-минеральной недостаточности - по 1 таблетке 1 раз в день. При состояниях сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах и минералах - по 1 таблетке 2 раза в день. Курс лечения 4 недели. Повторные курсы - по рекомендации врача.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 12 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

**Передозировка**

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Железо и кальций задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолонов. При одновременном применении витамина С и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа. Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии. Витамин В6 снижает активность леводопы у больных паркинсонизмом.

**Особые указания**

БАД. Не является лекарственным средством. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет - совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не рекомендуется использовать Компливит® одновременно с другими препаратами содержащими витамины и минералы. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать что содержание сахара в препарате Компливит® - 6762 мг (в 1 таблетке).

**Условия хранения**

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С.