
Инструкция по применению
Компливит Магний Таблетки массой 735 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 24.0



Описание

Действие Компливит Магний обусловлено свойствами входящих в состав компонентов. Совместимость компонентов в 1 таблетке обеспечена специальной технологией производства витаминно-минеральных комплексов. Компливит Магний содержит магний в легко усваиваемой форме магния лактата, а также суточную физиологическую дозу витаминов B6, B2, B12 и B5. Компливит Магний также содержит комплекс важнейших витаминов и минералов. Витамин А (ретинола ацетат) - участвует в формировании зрительных пигментов, необходим для сумеречного и цветового зрения; необходим для роста костей, нормальной репродуктивной функции, обеспечивает целостность эпителиальных тканей. Витамин Е (Токоферола ацетат) обладает антиоксидантными свойствами, совместно с селеном тормозит окисление ненасыщенных жирных кислот, поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз; оказывает положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани. Витамин B1 (тиамина хлорид) - играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, а также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах. Защищает мембраны клеток от токсического воздействия продуктов перекисного окисления. Витамин B2 (рибофлавин) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания, участвует в углеводном, белковом и жировом обменах, в поддержании нормальной зрительной функции глаза, синтезе гемоглобина. Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) - участвует в обмене веществ; необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. Витамин С (аскорбиновая кислота) - участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает сосудистую проницаемость. Обладает антиагрегантными и выраженными антиоксидантными свойствами. Никотинамид участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена. Фолиевая кислота принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, необходима для нормального эритропоэза. Кальция пантотенат играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия. Витамин B12 (цианокобаламин) участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток, необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина. Цинк обладает иммуномодулирующими свойствами, способствует усвоению витамина А, регенерации и росту волос. Медь способствует антиоксидантной защите клеток, участвует в синтезе коллагена, предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует профилактике остеопороза. Укрепляет стенки сосудов. Таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, от желто-коричневого до светло-коричневого цвета с розоватым оттенком.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Магния лактат, аскорбиновая кислота, наполнитель сахар, связующее вещество; коллидон К30, повидон; α-токоферола ацетат, никотинамид, кальция пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, ретинола ацетат, фолиевая кислота, цианокобаламин, меди сульфат, цинка оксид, скользящее вещество тальк, наполнитель лактоза (сахар молочный), разрыхлитель: крахмал картофельный, лимонная кислота, пленкообразующее вещество: гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза; скользящее вещество магния стеарат, корригент цвета титана диоксид, связующее вещество: лудипресс, полиэтиленгликоль; краситель азорубин. Компоненты Содержание в одной таблетке % от рекомендуемого уровня суточного потребления1 / % от адекватного уровня потребления* в одной таблетке: Витамин С (аскорбиновая кислота) 50 мг 83 % Магний 50 мг 12,5 % Витамин Е (α-токоферола ацетат) 10 мг 100 % Никотинамид 7,5 мг 42 % Кальция пантотенат 5 мг 83 % Витамин В2 (рибофлавин) 2 мг 125 %** Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг 100 % Цинк 2 мг 13 % Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) 1 мг 71 % Медь* 0,75 мг 75 % Витамин А (ретинола ацетат) 0,5 мг (1453,5 МЕ) 63 % Фолиевая кислота 100 мкг 50 % Витамин В12 (цианокобаламин) 3 мкг 300 %** 1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». * Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного союза ЕврАзЭС. ** Содержание не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов: А, С, Е, группы В (В1, В2, В6, В12, кальция пантотената), фолиевой кислоты, никотинамида, минеральных элементов: меди, цинка, магния. Профилактика и восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ. Повышенные физические и умственные нагрузки. Период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний, в том числе инфекционных. В комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь после еды. Для профилактики витаминно-минеральной недостаточности - по 1 таблетке 1 раз в день. При состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах и минералах, - по 1 таблетке 2 раза в день. Курс лечения 4 недели. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Может применяться во время беременности и лактации только по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется использовать Компливит® одновременно с другими препаратами, содержащими витамины и минералы. Железо и кальций задерживают всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолонов. При одновременном применении витамина С и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа. Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина, железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии. Витамин В6 снижает активность леводопы у больных паркинсонизмом.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством. Возможное окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Условия хранения

В сухом месте