Инструкция по применению
Компливит Мама таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30



Описание

Таблетки от желто-коричневого до светло-коричневого цвета с розовым оттенком двояковыпуклые продолговатой формы, покрытые пленочной оболочкой. На поперечном разрезе ядро желтовато-серого цвета с белыми, серыми и темно-фиолетовыми вкраплениями.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Содержание: Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ; сахарозу - 0,1155 мг; крахмал модифици-рованный - 0,594 мг; натрий-алюминия силикат -0,0099 мг; бутилгидрокситолуол - 0,0046 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,30 мг) - 0,5675 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество), Витамин Е (-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа Токоферола ацетат - 20,00 мг, мальтодекстрин - 9,80 мг, модифицированный пищевой крахмал - 9,80 мг, кремния диоксид - 0,40 мг) - 20,00 мг (в пересчете на 100 % вещество), Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 2,00 мг, Витамина В2 (рибофлавин) - 2,00 мг, Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5,00 мг, Витамин С (аскорбиновая кислота) - 100,00 мг, Никотинамид - 20,00 мг, Фолиевоя кислота - 0,40 мг, Кальция пантотенат - 10,00 мг, Витамина В12 (цианокобаламин) - 0,005 мг, Эргокальциферол (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 250 МЕ и соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 0,00125 мл) - 0,00625 мг (250 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество), Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 19,00 мг, Железо (в виде железа фумарата) - 10,00 мг, Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) - 2,50 мг, Медь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 2,00 мг, Цинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 10,00 мг, Марганец (в виде магния оксида) - 25,00 мг, Кальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 25,00 мг. Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 6,72 мг; тальк - 5,01 мг; крахмал картофельный - 78,77 мг; лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 6,15 мг; повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,04 мг; колликоат Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг; кальция стеарат - 8,20 мг; стеариновая кислота - 5,69 мг; сахароза (сахар-песок) - 58,00 мг. Состав оболочки: гипролоза - 7,60 мг; макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,18 мг; повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,40 мг; титана диоксид - 5,73 мг; тальк - 5,40 мг; краситель азорубин (Е 122) - 0,04 мг; краситель тропеолин - О - 0,15 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика гиповитаминоза и дефицита минеральных веществ: в период подготовки к беременности, во время беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Содержание: Витамин А (ретинола ацетат) (в виде порошка, содержащего ретинола ацетат - 1650 МЕ; сахарозу - 0,1155 мг; крахмал модифици-рованный - 0,594 мг; натрий-алюминия силикат -0,0099 мг; бутилгидрокситолуол - 0,0046 мг, желатин - 0,825 мг, воду очищенную до 3,30 мг) - 0,5675 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество), Витамин Е (-токоферола ацетат) (в виде порошка, содержащего dl-альфа Токоферола ацетат - 20,00 мг, мальтодекстрин - 9,80 мг, модифицированный пищевой крахмал - 9,80 мг, кремния диоксид - 0,40 мг) - 20,00 мг (в пересчете на 100 % вещество), Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 2,00 мг, Витамина В2 (рибофлавин) - 2,00 мг, Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5,00 мг, Витамин С (аскорбиновая кислота) - 100,00 мг, Никотинамид - 20,00 мг, Фолиевоя кислота - 0,40 мг, Кальция пантотенат - 10,00 мг, Витамина В12 (цианокобаламин) - 0,005 мг, Эргокальциферол (в виде маслянистой жидкости, содержащей эргокальциферол - 250 МЕ и соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное до 0,00125 мл) - 0,00625 мг (250 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество), Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 19,00 мг, Железо (в виде железа фумарата) - 10,00 мг, Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) - 2,50 мг, Медь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 2,00 мг, Цинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 10,00 мг, Марганец (в виде магния оксида) - 25,00 мг, Кальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 25,00 мг. Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 6,72 мг; тальк - 5,01 мг; крахмал картофельный - 78,77 мг; лимонная кислота (в виде лимонной кислоты моногидрата) - 6,15 мг; повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 6,04 мг; колликоат Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг; кальция стеарат - 8,20 мг; стеариновая кислота - 5,69 мг; сахароза (сахар-песок) - 58,00 мг. Состав оболочки: гипролоза - 7,60 мг; макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,18 мг; повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,40 мг; титана диоксид - 5,73 мг; тальк - 5,40 мг; краситель азорубин (Е 122) - 0,04 мг; краситель тропеолин - О - 0,15 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; Детский возраст; Гипервитаминоз А; Повышенное содержание кальция и железа в организме; Мочекаменная болезнь; В 12-дефицитная анемия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат рекомендован к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции. Иногда возможны тошнота и рвота. Подобные явления могут быть обусловлены как самой беременностью, так и индивидуальной чувствительностью к входящему в состав витаминно-минерального комплекса железу. При возникновении тошноты рекомендуется применять препарат во второй половине дня, сразу после еды, запивая достаточным количеством воды.

Передозировка

Аллергические реакции. Иногда возможны тошнота и рвота. Подобные явления могут быть обусловлены как самой беременностью, так и индивидуальной чувствительностью к входящему в состав витаминно-минерального комплекса железу. При возникновении тошноты рекомендуется применять препарат во второй половине дня, сразу после еды, запивая достаточным количеством воды.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций, поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолона. При одновременном применении аскорбиновой кислоты и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность развития гиперкальциемии.

Особые указания

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможное окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина. Для пациентов с сахарным диабетом: препарат содержит сахарозу, менее 0,033 хлебных единиц. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автотранспорта и выполнению других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.