Инструкция по применению
Компливит Мама Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 60

Описание

Действие препарата Компливит "MAMA" обусловлено эффектами входящих в его состав компонентов: α-Токоферола ацетат (витамин Е) - обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз; оказывает положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани. Дефицит витамина Е на ранних сроках беременности может явиться причиной выкидыша. Ретинол (витамин А) - играет важную роль в окислительно-восстановительных процессах, участвует в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов. Способствует нормальному спермато- и овогенезу, развитию плаценты, росту, нормальному развитию и дифференцировки эмбриональных тканей, в т.ч. эпителиальных структур и костной ткани. Участвует в формировании зрительных пигментов, необходимых для нормального сумеречного и цветового зрения; обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует рост костей. Тиамин (витамин В1) - в качестве коэнзима участвует в углеводном обмене, функционировании нервной системы. Рибофлавин (витамин В2) - важнейший катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия. Пиридоксин (витамин В6) - в качестве коэнзима принимает участие в белковом обмене и синтезе нейромедиаторов. Во время беременности необходим женщинам, ранее принимавшим пероральные контрацептивные средства, истощающие запасы пиридоксина в организме. Цианокобаламин (витамин В12) - участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток; необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина. Никотинамид (витамин РР) - участвует в процессах

тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена. Аскорбиновая кислота (витамин С) - обеспечивает синтез коллагена; участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; влияет на образование гемоглобина, созревание эритроцитов. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции. Кальция пантотенат - в качестве составной части коэнзима А играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления; способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия. Фолиевая кислота - принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального эритропоэза. На ранних стадиях беременности снижает риск развития у плода дефектов нервной трубки, а также риск возникновения пороков челюстно-лицевой области. Железо - участвует в эритропоэзе, в составе гемоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани; предупреждает развитие анемии у беременных женщин, особенно во II и III триместрах беременности. Медь - предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует профилактике остеопороза. Укрепляет стенки сосудов. Марганец - предупреждает остеоартрит. Обладает противовоспалительными свойствами. Цинк - необходим для нормального формирования скелета плода и регенерации тканей, участвует в образовании некоторых гормонов, включая инсулин; снижает вероятность развития внутриутробных аномалий. В комплексе с витамином А способствует формированию нормального сумеречного и цветового зрения. Магний - нормализует артериальное давление, оказывает успокаивающее действие, уменьшает вероятность самопроизвольного аборта, развития преэклампсии, преждевременных родов. Кальций - необходим для формирования костного вещества, свертывания крови, осуществления процесса передачи нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, нормальной деятельности миокарда. Фосфор - укрепляет костную ткань и зубы, усиливает минерализацию, входит в состав АТФ - источника энергии клеток.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Витамин А (ретинола ацетат) в виде порошка, содержащего ретинола ацетат, сахарозу, крахмал модифицированный, натрия-алюминия силикат, бутилгидрокситолуол, желатин, воду очищенную - 0,5675 мг (1650 МЕ) (в пересчете на 100 % вещество)   Витамин Е (α-токоферола ацетат) в виде порошка, содержащего DL-а-токоферола ацетат, желатин, сахарозу, кукурузный крахмал, натрия-алюминия силикат (Е 554), воду - 20,00 мг (в пересчете на 100 % вещество) Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) - 2,00 мг Витамин В2 (рибофлавин) - 2,00 мг   Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) - 5,00 мг   Витамин С (аскорбиновая кислота) - 100,00 мг   Никотинамид -20,00 мг   Фолиевая кислота - 0,40 мг   Кальция пантотенат - 10,00 мг   Витамин В12 (цианокобаламин) - 0,005 мг   Эргокальциферол в виде маслянистой жидкости, содержащей Эргокальциферол и соевых бобов масло рафинированное, дезодорированное - 0,00625 мг (250 МЕ) (в пересчете на   100 % вещество)   Фосфор (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 19,00 мг   Железо (в виде железа фумарата) - 10,00 мг   Марганец (в виде марганца сульфата моногидрата) - 2,50 мг Медь (в виде меди сульфата пентагидрата) - 2,00 мг Цинк (в виде цинка сульфата гептагидрата) - 10,00 мг Магний (в виде магния оксида) - 25,00 мг Кальций (в виде кальция гидрофосфата дигидрата) - 25,00 мг Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 6,72 мг, тальк – 5,01 мг, крахмал картофельный – 62,97 мг, лимонная кислота – 6,15 мг, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный) – 6,04 мг, кальция стеарат – 8,20 мг, стеариновая кислота – 5,69 мг, сахароза (сахар) – 74,02 мг   Состав оболочки: гипролоза – 7,6 мг, макрогол – 4000 – 3,18 мг, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный) – 8,4 мг, титана диоксид – 5,73 мг, тальк – 5,4 мг, краситель азорубин (Е 122) – 0,04 мг, краситель тропеолин-О – 0,15 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика гиповитаминоза и дефицита минеральных веществ: в период подготовки к беременности; во время беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Обычно рекомендуется принимать внутрь по 1 таблетке во время или сразу после завтрака, запивая обильным количеством жидкости. Длительность приема препарата определяется врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст. Гипервитаминоз А, Повышенное содержание кальция и железа в организме,   Мочекаменная болезнь, В12-дефицитная анемия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат применяют при беременности и в период лактации по показаниям в рекомендуемых дозах.

Побочные действия

Аллергические реакции. Иногда возможны тошнота и рвота. Подобные явления могут быть обусловлены как самой беременностью, так и индивидуальной чувствительностью к входящему в состав витаминно-минерального комплекса железу. При возникновении тошноты рекомендуется применять препарат во второй половине дня, сразу после еды, запивая достаточным количеством воды.

Передозировка

При передозировке следует обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций, поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолона. При одновременном применении витамина С и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность развития гиперкальциемии.

Особые указания

Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможное окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина. Для пациентов с сахарным диабетом: препарат содержит сахарозу, менее 0,033 хлебных единиц.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C