Инструкция по применению
Компливит Таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30



Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Ретинола ацетат (вит. А) - 1,135 мг (3300 МЕ) α -токоферола ацетат (вит. Е) - 10 мг Аскорбиновая кислота (вит. С) - 50 мг Тиамина гидрохлорид (вит. В1) - 1 мг Рибофлавина мононуклеотид (вит. В2) - 1,27 мг Кальция пантотенат - 5 мг Пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) - 5 мг Фолиевая кислота - 100 мкг Цианокобаламин (вит. В12) - 12,5 мкг Никотинамид - 7,5 мг Рутозид (рутин) - 25 мг Тиоктовая (липоевая) кислота - 2 мг Кальций (в форме кальция фосфата дигидрата) - 50,5 мг Магний (в форме магния гидроортофосфата тригидрата) - 16,4 мг Фосфор (в форме магния гидрофосфата Тригидрата и кальция фосфата дигидрата) - 60 мг Железо (в форме железа сульфата гептагидрата) - 5 мг Медь (в форме меди сульфата пентагидрата) - 750 мкг Цинк (в форме цинка сульфата гептагидрата) - 2 мг Марганец (в форме марганца сульфата моногидрата) - 2,5 мг Кобальт (в форме кобальта сульфата гептагидрата) - 100 мкг Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая, тальк, крахмал картофельный, лимонная кислота, повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный), кальция октадеканоат (кальция стеарат), сахароза (сахар), мука пшеничная, магния гидроксикарбонат (магний углекислый основной водный), желатин, титана диоксид, воск пчелиный.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и восполнение дефицита витаминов и минеральных веществ, Повышенные физические и умственные нагрузки, Период выздоровления после продолжительных и/или тяжело протекающих заболеваний в том числе инфекционных, В комплексном лечении при назначении антибиотикотерапии.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь после еды. Для профилактики витаминно-минеральной недостаточности - по 1 таблетке 1 раз в день. При состояниях сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах и минералах - по 1 таблетке 2 раза в день. Курс лечения 4 недели. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата промывание желудка прием активированного угля внутрь симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Железо и кальций задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолонов. При одновременном применении витамина С и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты содержащие алюминий магний кальций а также колестирамин уменьшают всасывание железа. Аскорбиновая кислота повышает всасывание препаратов группы пенициллина железа. При одновременном назначении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность гиперкальциемии. Витамин В6 снижает активность леводопы у больных паркинсонизмом.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет - совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина. Не рекомендуется использовать Компливит® одновременно с другими препаратами содержащими витамины и минералы. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать что содержание сахара в препарате Компливит® - 6762 мг (в 1 таблетке).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.