# Инструкция по применению
# Компливит Триместрум таблетки 30 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30

## Описание

Таблетки в оболочке Компливит Триместрум 3 триместр компенсирует витаминно-минеральную недостаточность, положительно влияет на содержание гемоглобина в крови и другие ее показатели, повышает переносимость физических нагрузок (профессиональных и спортивных), в том числе длительных.

## Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

## Состав

Основные компоненты: никотинамид, гидрохлорид пиридоксина, марганец, рибофлавина, ацетат токоферола (альфа-форма), рутозид, магний, колекальциферол, кальций, пантотенат кальция, фолиевая кислота, гидрохлорид тиамина, аскорбиновая кислота, тиоктовая кислота, цианокобаламин, лютеин, медь, селен, йод.
Дополнительные вещества: стеарат кальция, лимонная кислота, сахароза, крахмал, тальк, низкомолекулярный повидон. Компоненты плёночной оболочки: гумми-арабик, тальк, диоксид титана, сахар, пчелиный воск, шеллак.

## Форма выпуска

Таблетки

**Показания**

Гиповитаминозы, перенесенные тяжёлые заболевания, пониженная общая сопротивляемость организма (в весенне-зимний период), атеросклероз, нарушения липидного обмена (гиперлипидемия с повышенным содержанием холестерина, бета-липопротеидов, триглицеридов) и снижение толерантности к углеводам.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, во время или сразу после приема пищи, запивая обильным количеством жидкости. При отсутствии особых рекомендаций врача, рекомендуется принимать по 1 таблетке в сутки. Длительность приема препарата определяется врачом.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применяется с 28 недели и до родоразрешения. Разрешён приём во время лактации.

**Побочные действия**

Возможно возникновение аллергических реакций. Иногда возможно возникновение тошноты и рвоты. Подобные явления могут быть обусловлены как самой беременностью, так и индивидуальной чувствительностью к входящему в состав витаминно-минерального комплекса железу. При возникновении тошноты рекомендуется принимать препарат во второй половине дня, сразу после еды, запивая достаточным количеством воды.

**Передозировка**

Разовый приём больших доз требует квалифицированной помощи, включающей мероприятия по дезинтоксикации: назначение энтеросорбирующих лекарственных средств (Смекта, Активированный уголь), своевременное промывание желудка, проведение посиндромной терапии для купирования симптоматики отравления. Длительная терапия проявляется гипервитаминозами.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат содержит железо и кальций, поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов и производных фторхинолона. При одновременном применении аскорбиновой кислоты и сульфаниламидных препаратов короткого действия увеличивается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин, уменьшают всасывание железа. При одновременном применении мочегонных средств из группы тиазидов увеличивается вероятность развития гиперкальциемии.

**Особые указания**

Противопоказания: гипервитаминозы, МКБ (наличие диагностированных конкрементов мочеполовой системе), индивидуальная гиперчувствительность, анемия (B12-дефицитная форма), повышенное содержание Fe и Ca, ограничение по возрасту — до 14 лет, мальабсорбция (глюкозо-галактозная форма), недостаток изомальтазы, индивидуальная форма непереносимости фруктозы.