Инструкция по применению
Компливит Актив Таблетки покрытые оболочкой 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 24

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка Компливит-Актив содержит: ретинола ацетат (вит. А) 791,2 мкг (2300 МЕ)   альфа-токоферола ацетат (вит. Е) 10 мг эргокальциферол 2,5 мкг (100 МЕ) аскорбиновая кислота (витамин С) 50 мг тиамина гидрохлорид (витамин В1) 1 мг рибофлавин 1 мг кальция пантотенат (витамин В5) 5 мг пиридоксина гидрохлорид (вит. В6) 1,5 мг никотинамид 7,5 мг фолиевая кислота 0,2 мг цианокобаламин (витамин В12) 3 мкгрутозид (рутин) 10мг кальций (в форме фосфата дигидрата) 35 мг железо (в форме железа (II) сульфата семиводного) 10 мг фосфор (в форме кальция фосфата дигидрата) 27 мг медь (в форме меди (II) сульфата пятиводного) 1 мг марганец (в форме марганца (II) сульфата пятиводного) 1мг цинк (в форме сульфата семиводного) 5 мг магний (в форме карбоната основного) 22 мг фтор (в форме натрия фтористого) 0,5 мг йод (в форме натрия йодистого) 0,1 мг селен (в форме натрия селенистокислого) 10 мкг Вспомогательные вещества: тальк 2,20 мг, крахмал картофельный - 133,0 мг, лимонной кислоты моногидрат - 16,63 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,75 мг, кальция стеарат - 6,78 мг, стеариновая кислота - 4,54 мг, колликоат® Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65 %, поливиниловый спирт 35-45 %, диоксид кремния 0,1-0,3 %) - 0,22 мг, сахароза (сахар белый) - 119,1995 мг. Состав оболочки: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) – 8,395 мг, макрогол (макрогол-4000, полиэтиленоксид-4000) - 3,197 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный, повидон К-17) - 8,71 мг, титана диоксид - 5,703 мг, тальк - 5,776 мг, индигокармин - 0,044 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) - 0,175 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Детям в возрасте с 7 до 12 лет для профилактики и восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ: - при несбалансированном и неполноценном питании; - при повышенных физических и умственных нагрузках, при регулярных занятиях спортом; - в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой.

Способ применения и дозы

При применении необходимо проконсультироваться с врачом. Внутрь, по 1 таблетке 1 раз в день после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Длительность курса 1 месяц.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 7 лет. Гипервитаминоз A, гипервитаминоз D; Повышенное содержание кальция в организме (гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, саркоидоз), Повышенное содержание железа в организме (гемосидероз, гемохроматоз, сидероахрестическая анемия). Не рекомендуется применение при B12-дефицитной анемии.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Пациент должен быть проинформирован, что при случайной передозировке следует обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля, проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат содержит железо и кальций, поэтому задерживает абсорбцию из ЖКТ антибиотиков из группы тетрациклина и производных фторхинолона. При одновременном применении витамина С и сульфаниламидных препаратов короткого действия повышается риск развития кристаллурии. Антацидные препараты, содержащие алюминий, магний, кальций, а также колестирамин уменьшают всасывание железа. При одновременном назначении тиазидных диуретиков повышается риск развития гиперкальциемии.

Особые указания

При возникновении аллергических реакций следует отменить препарат. Не рекомендуется одновременное применение других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в составе препарата рибофлавина. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автотранспорта и выполнению других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C