Инструкция по применению
Кондронова 250 мг+200 мг Капсулы 120 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Панацея Биотек
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 120
Дозировка действующего вещества: 250 мг+200 мг

Описание

Синие твердые желатиновые капсулы размера «0», содержащие белый зернистый порошок.

Действующее вещество

Глюкозамин+Хондроитина сульфат

Состав

В каждой твердой желатиновой капсуле содержится: Глюкозамина сульфата 250 мг Хондроитина сульфата 200 мг Вспомогательные вещества: маннитол, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, тальк очищенный. Оболочка капсулы содержит очищенную воду, желатин, натрия лаурилсульфат, повидон, бронопол, краситель титана диоксид, краситель бриллиантовый синий, краситель хинолиновый желтый.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Глюкозамин Абсорбция У человека биодоступность глюкозамина при пероральном приеме составляет 25%. Распределение После абсорбции пероральной дозы радиоактивно меченый глюкозамин вначале обнаруживается в компонентах плазмы и позднее проникает в ткани. Наивысшие концентрации были обнаружены в печени, почках и суставном хряще. Около 30 % принятой дозы длительно персистирует в тканях костей и мышц. Элиминация Фракция глюкозамина, которая не метаболизируется или не связывается с белками плазмы, экскретируется преимущественно с мочой. Большая часть препарата, обнаруживаемая в кале после приема внутрь, представляет собой неабсорбировавшуюся фракцию. Конечный период полувыведения препарата, связанного с белками плазмы, составляет 68 ч. Хондроитина сульфат Абсорбция При приеме внутрь хондроитина сульфата однократно в дозе 0,8 г (или два раза в сутки в дозе 0,4 г.) концентрация хондроитина сульфата в плазме резко возрастает на протяжении 24 ч. Абсолютная биодоступность составляет 12 %. Метаболизм Хондроитина сульфат метаболизируется посредством десульфирования (после введения низкомолекулярного хондроитина сульфата). Элиминация Хондроитина сульфат выводится мочой. Период полувыведения составляет 310 мин.

Показания

Остеоартроз периферических суставов и суставов позвоночника.

Способ применения и дозы

Перорально. Взрослые по 2 капсулы 2-3 раза в сутки. Через 60 дней терапии дозу следует постепенно снижать в зависимости от потребности конкретного пациента. Курс лечения: 2-3 месяца (длительность лечения определяется врачом). Повторно курс лечения возможен только после консультации с врачом.

Противопоказания

Препарат КОНДРОнова® противопоказан: пациентам с гиперчувствительностью к ингредиентам этого препарата, беременным и кормящим женщинам, детям.

Побочные действия

К наиболее частым побочным эффектам относятся легкие желудочно-кишечные расстройства (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение, кожные аллергические реакции, головная боль, боль в ногах и периферические отеки, сонливость, бессонница и тахикардия. Возможны аллергические реакции, обострение бронхиальной астмы.

Передозировка

Случаи передозировки препарата КОНДРОнова® неизвестны. При возникновении передозировки рекомендуется промывание желудка и проведение симптоматической терапии. Чрезвычайно высокие дозы глюкозамина (во много раз превышающие рекомендуемую суточную дозу) могут вызывать диарею или тошноту, появление геморрагических высыпаний.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление действия антикоагулянтов и антиагрегантов. КОНДРОнова® увеличивает абсорбцию тетрациклинов, снижает действие полусинтетических пенициллинов. Препарат совместим с глюкокортикоидными препаратами.

Особые указания

При непереносимости морепродуктов вероятность развития аллергических реакций возрастает.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.