Инструкция по применению
Кондронова 250 мг+200 мг Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Индия
Производитель: Панацея Биотек
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Глюкозамин+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг+200 мг
Срок годности: 2 года

Действующее вещество

Глюкозамин+Хондроитина сульфат

Состав

Хондроитин сульфат 200 мг, глюкозамина гидрохлорид 250 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Глюкозамин;Биодоступность при пероральном приеме - 25% (эффект первого прохождения через печень).; Распределяется в тканях: наибольшие концентрации обнаруживаются в печени, почках и суставном хряще. Около 30% принятой дозы длительно персистирует в костной и мышечной ткани.; Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде; частично - с калом. T1/2 - 68 ч.; Хондроитин сульфат; При приеме внутрь однократно в дозе 800 мг (или 2 раза/сут в дозе 400 мг) концентрация в плазме резко возрастает на протяжении 24 ч. Абсолютная биодоступность - 12%. Около 10 и 20% принятой дозы абсорбируется в виде высокомолекулярных и низкомолекулярных производных соответственно.; Кажущийся Vd - около 0.44 мл/г.; Метаболизируется посредством десульфирования.; Выводится с мочой. T1/2 - 310 мин.

Показания

Остеоартроз периферических суставов и суставов позвоночника.

Способ применения и дозы

Перорально. Взрослые по 2 капсулы 2-3 раза в сутки. Через 60 дней терапии дозу следует постепенно снижать в зависимости от потребности конкретного пациента. Курс лечения: 2-3 месяца (длительность лечения определяется врачом). Повторно курс лечения возможен только после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.; Беременности и период лактации.; Детский возраст.; С осторожностью: Сахарный диабет.; Бронхиальная астма.; Склонность к кровотечениям.; Тромбофлебиты.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности, в период лактации (грудноговскармливания).

Побочные действия

легкие желудочно-кишечные расстройства (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор); головокружение; кожные аллергические реакции; головная боль; боль в ногах и периферические отеки; сонливость; бессонница; тахикардия; ;возможны аллергические реакции; обострение бронхиальной астмы.

Передозировка

Симптомы: случаи передозировки неизвестны.; Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов и глюкозамина.; Препарат совместим с НПВС и ГКС.

Особые указания

При появлении нежелательных эффектов со стороны ЖКТ дозу препарата следует уменьшить в 2 раза, а при отсутствии улучшения - отменить препарат.; При отсутствии клинического эффекта после лечебного курса по 4 капс./сут в течение 4 недель следует решить вопрос об уточнении диагноза.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °C