Инструкция по применению
Кордиамин Раствор для приема внутрь 25 % 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Никетамид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 25%
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Никетамид

Состав

Финастерид. Вспомогательные вещества: Состав пленочной оболочки:

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Обладает стимулирующим эффектом на центральную нервную систему, и, главным образом - на такие центры в продолговатом мозгу, как дыхательный и сосудодвигательный центр. Имеет хорошую всасываемость вне зависимости от способа введения.

Показания

* Коллапс, * асфиксия, * шоковые состояния, * асфиксия новорожденных, * нарушение кровообращения при инфекционных заболеваниях, * отравление снотворными, наркотиками, барбитуратами

Способ применения и дозы

Внутрь (независимо от приема пищи) или парентерально. Взрослым - по 15–40 капель на прием 2–3 раза в день, детям - по столько капель на прием, сколько ребенку лет. П/к, в/м и в/в вводят взрослым в дозе 1–2 мл 1–3 раза в день, детям под кожу - 0,1–0,75 мл в зависимости от возраста. Введение в вену должно производиться медленно. П/к и в/м инъекции Кордиамина болезненны; для уменьшения болезненности иногда предварительно можно ввести в место инъекции новокаин (взрослым 1 мл 0,5–1% раствора, детям - в соответствии с возрастом). Высшие дозы для взрослых - внутрь и под кожу разовая 2 мл (60 капель), суточная-6 мл (180 капель). Высшая разовая доза под кожу и в вену при отравлении наркотиками-5 мл.

Противопоказания

* Гиперчувствительность, * эпилепсия, * приступы тонико-клонических судорог в анамнезе, * гипертермия у детей

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан

Побочные действия

Кордиамин может спровоцировать появление ряда симптомов, которые расцениваются в качестве побочных эффектов. К проявлениям побочного действия Кордиамина относят следующие симптомы:

Передозировка

При передозировке у пациентов наблюдается развитие тоникоклонических судорог, возбуждения, повышения артериального давления. Показано внутривенное введение эуфиллина

Взаимодействие с другими препаратами

Нельзя одновременно с Кордиамином вводить аскорбиновую кислоту, поскольку они несовместимы. Кордиамин усиливает эффект психостимуляторов и антидепрессантов. Но препарат значительно уменьшает эффекты и действие наркотических обезболивающих, снотворных, нейролептиков, транквилизаторов, противосудорожных, хлорпромазина и опиниазида. Резерпин увеличивает риск развития судорог на фоне применения Кордиамина.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении