Инструкция по применению
Корилип Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кокарбоксилаза+Рибофлавин+Тиоктовая кислота
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 2.0



Действующее вещество

Кокарбоксилаза+Рибофлавин+Тиоктовая кислота

Состав

1 ректальный суппозиторий содержит: кокарбоксилазы гидрохлорид 0,025 г, рибофлавин 0,002 г, липоевую кислоту. 0,012 г Вспомогательные вещества: масло какао или твердый жир до массы 0,95 г.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Как самостоятельное лечение или как дополнение к базисной терапии при различных патологических состояниях у детей, в том числе: - Хроническая тканевая гипоксия. - Снижение иммунитета. - Бактериальные и вирусные инфекции. - Хронические соматические заболевания. - Хронические интоксикации. - Состояния после перенесенных тяжелых заболеваний. - Нарушение питания (гипотрофия).

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально. Освободив из упаковки, ввести суппозиторий в задний проход (после предварительного опорожнения кишечника). Детям раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) - по 1 суппозиторию в сутки. Детям от 6 до 14 лет - 1-2 суппозитория в сутки. Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения 3-4 курса с промежутком в 20 дней (3-4 месяца).

Противопоказания

- Реакции гиперчувствительности на компоненты, входящие в состав препарата. - Воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

Особые указания

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

Условия хранения

При комнатной температуре