Инструкция по применению
Корилип-Нео Суппозитории ректальные 10 шт



Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кокарбоксилаза+Рибофлавин+Тиоктовая кислота
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24

Действующее вещество

Кокарбоксилаза+Рибофлавин+Тиоктовая кислота

Состав

1 супп. активное вещество: кокарбоксилазы гидрохлорид (кокарбоксилаза) 12,5 мг рибофлавин 1 мг липоевая кислота (тиоктовая кислота) 6 мг вспомогательные вещества: жир твердый (жирных кислот глицериды) — 930,5 мг

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

С профилактической и лечебной целью в комплексной терапии при различных патологических состояний у детей, таких как: хроническая тканевая гипоксия; снижение иммунитета; бактериальные и вирусные инфекции, в т.ч. острые кишечные инфекции; хронические соматические заболевания; хронические интоксикации; нарушение питания (гипотрофия) у детей.

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, ввести суппозиторий в задний проход после предварительного опорожнения кишечника. Суппозитории назначают детям до 1 года по 1 суппозиторию в сут. Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения — 3-4 курса с промежутком в 20 дней (3—4 месяца).

Противопоказания

реакции гиперчувствительности на компоненты, входящие в состав препарата; воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции — крапивница, зуд, бронхоспазм, диспептические явления. При появлении побочных реакций прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может использоваться при комплексной терапии.

Особые указания

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °C