Инструкция по применению
Корментол Капсулы подъязычные 100 мг 15 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Румыния
Производитель: Бофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 15
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Капсулы мягкие, желатиновые, овальной формы, от светло-желтого до светлого коричневато-желтого цвета. Содержимое капсул - прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком маслянистая жидкость с запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на одну капсулу: Действующее вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате - 100,00 мг, Вспомогательные вещества: альфа-токоферола ацетат (витамин Е) - 0,45 мг, масло оливковое рафинированное - q. s. до 160,00 мг, Желатиновая оболочка капсулы: желатин - 72,0000 мг, вода очищенная - 56,2384* мг, глицерол - 31,5216 мг, метилпарагидроксибензоат (Е 218) - 0,2400 мг. *Указано закладываемое количество воды очищенной. Вода частично испаряется в процессе производства и ее содержание в готовом продукте меньше закладываемого.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

При сублингвальном (под язык) применении левоментол абсорбируется со слизистой оболочки ротовой полости. После всасывания препарат метаболизируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Корментол назначают взрослым под язык, по 1 капсуле 2-3 раза в день. Капсулу следует держать под языком до ее полного рассасывания. Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном терапевтическом эффекте или, когда у отдельных пациентов в ближайшие 5 минут после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, тяжелая артериальная гипотензия, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Тошнота, чувство дискомфорта в животе, слезотечение, головокружение, также возможны кратковременное снижение артериального давления, сонливость. Описанные явления, как правило, кратковременны, проходят самостоятельно и не требуют отмены препарата. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, кожный зуд, ангионевротический отек). В связи с наличием в составе метилпарагидроксибензоата, препарат может вызывать аллергические реакции замедленного типа (например, контактный дерматит) или (реже) реакции немедленного типа (крапивница, бронхоспазм). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, головная боль, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, повышенная возбудимость. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении может усиливать действие гипотензивных препаратов, седативный эффект психотропных средств, опиоидных анальгетиков, средств для общей и местной анестезии, этанола. Одновременный прием с нитратами способствует уменьшению головной боли, возникающей при их применении.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием алкоголя.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В связи с возможными побочными эффектами (головокружение, сонливость) в период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, работе с механизмами или занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте