Инструкция по применению
Корвалол ФИТО Капли 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Пустырника травы настойка+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие взвеси мелких частиц. В процессе хранения допускается образование осадка.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Пустырника травы настойка+Этилбромизовалерианат

Состав

Активные компоненты: пустырника травы настойка – 720,00 мг этилбромизовалерианат – 20,00 мг мяты перечной листьев масло –1,42 мг. Вспомогательные вещества: вода очищенная – до 1 мл. Для получения 100 мл пустырника настойки используют 20 г пустырника травы и достаточное количество спирта этилового 70 %.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике этилбромизовалерианата, пустырника и компонентов мяты перечной отсутствуют

Показания

Нарушения сна, неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью и возбудимостью, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями в качестве спазмолитического средства – при спазмах кишечника, а также в качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

Способ применения и дозы

Взрослым Принимать внутрь, до приема пищи, 3 раза в день по 30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-40 мл) воды. Курс лечения 4 недели (28 дней). Продолжительность приема может быть увеличена по рекомендации врача.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата тяжелые нарушения функции почек и/или печени эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (фаза обострения) беременность период грудного вскармливания детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность Корвалола Фито при беременности не установлена и его применение в этот период противопоказано. Данные о проникновении компонентов препарата в грудное молоко отсутствуют, поэтому при необходимости применения в период кормления грудью следует решать вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции Со стороны центральной нервной системы: сонливость, слабость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания Со стороны сердечно-сосудистой системы: замедление сердечного ритма Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия. Указанные явления проходят при снижении дозы препарата или прекращении приема препарата. При длительном применении высоких доз препарата возможно развитие лекарственной зависимости, а также накопление брома в организме и развитие явлений бромизма, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка возможна при частом и длительном применении препарата. При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Симптомы: слабость, сонливость, головокружение. При длительном применении возможно проявление хронической интоксикации бромом (См. раздел Побочное действие). Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении лекарственного препарата Корвалол Фито с препаратами угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные, нейролептики, транквилизаторы) возможно взаимное усиление эффектов. Усиливает действие спазмолитических, анальгезирующих средств. Алкоголь усиливает эффект препарата и его токсичность.

Особые указания

Опыт применения препарата у детей до 18 лет, при беременности и в период грудного вскармливания отсутствует. Не рекомендуется длительное применение препарата в высоких дозах, в связи с возможным токсическим действием при кумуляции брома в организме. Во время применения препарата не следует употреблять алкоголь. Корвалол Фито содержит 47,5 % этилового спирта, таким образом при приеме внутрь в максимально разовой дозе препарата содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет 0,308 г, в максимальной суточной дозе – 0,923 г.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.