Инструкция по применению
Корвалол Фито Таблетки 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Пустырника травы настойка+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 50



Описание

Корвалол Фито таб. – комбинированный препарат, седативное средство. Выпускается в форме таблеток (0,58 мг + 14,00 мг + 8,20 мг и 1,16 мг + 28,00 мг + 16,40 мг) по 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку . Таблетки принимают до приема пищи, запивая водой. Препарат оказывает седативное и спазмолитическое действие, умеренное кардиотоническое действие (замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений), обладает умеренными гипотензивными свойствами. Принимают в качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, при нарушении засыпания, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, в качестве спазмолитического средства – при спазмах кишечника. Имеются противопоказания (в том числе, беременность, детский возраст до 18 лет и др.) Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Пустырника травы настойка+Этилбромизовалерианат

Состав

Активные вещества: пустырника травы экстракт (пустырника экстракт сухой) – 14,00 мг или 28,00 мг, этилбромизовалерианат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты) – 8,20 мг или 16,40 мг, мяты перечной листьев масло (мяты перечной масло) – 0, 58 мг или 1,16 мг. Вспомогательные вещества: лактоза (лактозы моногидрат) – 79,21 мг или 158,42 мг, бетадекс (бета-циклодекстрин) – 55,55 мг или 111,10 мг, крахмал картофель-ный – 35,56 мг или 71,12 мг, магния алюмометасиликат (Неусилин UFL 2) – 4,00 мг или 8,00 мг, тальк – 2,00 мг или 4,00 мг, магния стеарат – 0,90 мг или 1,80 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике этилбромизовалерианата, травы пустырника и компонентов мяты перечной отсутствуют.

Показания

В качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, при нарушении засыпания, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, в качестве спазмолитического средства – при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь, до приема пищи, запивая водой. Для таблеток, 0,58 мг + 14,00 мг + 8,20 мг: взрослым по 2 таблетки 2 раза в сут-ки. Для таблеток, 1,16 мг + 28,00 мг + 16,40 мг: взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 3 таблеток. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения 4 недели (28 дней). Продолжительность приема может быть увели-чена по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек и/или печени, беременность, период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний/состояний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения лекарственного препарата Корвалол Фито, таблетки при беременности не установлена, применение препарата во время беременности противопоказано. Данные о проникновении компонентов препарата в грудное молоко отсутствуют, поэтому при необходимости применения препарата в период лактации следует решать вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, Со стороны центральной нервной системы: сонливость, слабость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия. Указанные явления проходят при снижении дозы препарата или прекращении приема препарата. При длительном применении высоких доз препарата возможно развитие лекарственной зависимости, а также накопление брома в организме и развитие бромизма, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, лекарственная зависимость. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка возможна при частом и длительном применении препарата. При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Симптомы: слабость, сонливость, головокружение. При длительном применении возможно проявление хронической интоксикации бромом (см. раздел Побочное действие). Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении лекарственного препарата Корвалол Фито, таблетки с препаратами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные, нейролептики, транквилизаторы) возможно взаимное усиление эффектов. Усиливает действие спазмолитических, анальгезирующих средств. Алкоголь усиливает эффект препарата и его токсичность.

Особые указания

Опыт применения препарата у детей до 18 лет, при беременности и в период грудного вскармливания отсутствует. Не рекомендуется длительное применение препарата в высоких дозах, в связи с возможным токсическим действием при кумуляции брома в организме. Во время применения препарата не следует употреблять алкоголь.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.