Инструкция по применению
Корвалол-Реневал Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат

Состав

Действующие вещества: Этилбромизовалерианат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты) - 2000 мг Фенобарбитал - 1826 мг Мяты перечной листьев масло (мяты перечной масло) - 142 мг Вспомогательные вещества: спирт этиловый (этанол) 95% - 79 мл натрия гидроксида раствор 1 М - до pH 8,0-8,5 вода очищенная - до 100 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике этилбромизовалерианата и компонентов мяты перечной отсутствуют. При приеме внутрь фенобарбитал всасывается медленно полностью. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 1-2 часа связь с белками плазмы - 50% у новорожденных - 30-40%. Метаболизируется в печени индуцирует микросомальные ферменты печени изоферментами CYP3A4 CYP3A5 CYP3A7 (скорость ферментативных реакций возрастает в 10-12 раз). Кумулируется в организме. Период полувыведения составляет 2-4 дня. Выводится почками в виде глюкуронида около 25% - в неизменном виде. Проникает в грудное молоко и через плацентарный барьер.

Показания

В качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы при неврозоподобных состояниях сопровождающихся повышенной раздражительностью при нарушении засыпания тахикардии состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, в качестве спазмолитического средства - при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Доза устанавливается индивидуально. Внутрь перед приемом пищи предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды. Разовая доза у взрослых составляет 30 капель при необходимости (например при тахикардии) разовая доза максимально может быть увеличена до 40-50 капель. Кратность приема у взрослых - 2-3 раза в сутки. У детей с 3-х лет применяют по 1 капле на год жизни ребенка на один прием в сутки. Необходимость применения повторной дозы определяется врачом в зависимости от клинической картины заболевания. Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек и/или печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма заболевания головного мозга, беременность период грудного вскармливания, детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Корвалол во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано так как препарат содержит фенобарбитал который проникает через плаценту и обладает тератогенным действием оказывает отрицательное влияние на формирование и дальнейшее функционирование центральной нервной системы плода и новорожденного проникает в грудное молоко возможно развитие физической зависимости у новорожденного. При необходимости применения в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении кормления грудным молоком.

Побочные действия

Сонливость головокружение замедление сердечного ритма снижение способности к концентрации внимания аллергические реакции. Могут возникать нарушения со стороны ЖКТ. Указанные явления проходят при снижении дозы препарата или прекращении приема препарата. При длительном применении препарата возможно возникновение лекарственной зависимости привыкания синдрома "отмены" а также накопление брома в организме и развитие явлений бромизма (депрессивное настроение апатия ринит конъюнктивит геморрагический диатез нарушение координации движений). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: угнетение центральной нервной системы (ЦНС) нистагм атаксия снижение артериального давления возбуждение головокружение слабость хроническая интоксикация бромом (депрессия апатия ринит конъюнктивит геморрагический диатез нарушение координации движений). Лечение: прекращение приема препарата промывание желудка и проведение симптоматической терапии при угнетении ЦНС - кофеин никетамид.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственные средства угнетающие ЦНС усиливают действие препарата. Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность лекарственных средств метаболизирующихся в печени (в том числе производных кумарина гризеофульвина глюкортикостероидов пероральных контрацептивов), усиливает действие местноанестезирующих анальгезирующих и снотворных средств. Препарат усиливает токсичность метотрексата. Действие препарата усиливается на фоне применения препаратов вальпроевой кислоты.

Особые указания

В 1 капле препарата содержится 0022 г абсолютного этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата (50 капель) содержится 11 г абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе (150 капель) содержится 33 г абсолютного этилового спирта. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат содержит не менее 70 объемных процентов этанола и фенобарбитал поэтому в период приема препарата Корвалол необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.