Инструкция по применению
Корвалол КФФ Капли 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20 мг+ 18,26 мг

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат

Состав

Действующие вещества: Этилбромизовалерианата (этилового эфира #бромизовалериановой кислоты) 20,0 г, Фенобарбитала 18,26 г, Масла мяты перечной 1,42 г. Вспомогательные вещества: Натрия гидроксида (натра едкого) 3,15 г, Этанола (этилового спирта) 5% 580 мл, Воды очищенной 420 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

Корвалол назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечнососудистой системы неврозоподобных состояниях сопровождающихся повышенной раздражительностью нарушенном засыпании тахикардии состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями а в качестве спазмолитического средства при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Дозировка устанавливается индивидуально. Внутрь перед приемом пищи предварительно растворив в небольшом количестве (30-40 мл) воды 2-3 раза день. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель. Детям назначают по 3-15 капель в сутки (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания). Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек иили печени период лактации (при необходимости назначения в период кормления следует решать вопрос о прекращении грудного вскармливания) беременность.

Побочные действия

Сонливость головокружение замедление сердечного ритма снижение способности к концентрации внимания аллергические реакции. При длительном приеме явления бромизма привыкание лекарственная зависимость синдром "отмены".

Передозировка

Симптомы: угнетение ЦНС нистагм атаксия снижение артериального давления нарушения формулы крови возбуждение хроническая интоксикация бромом (депрессия апатия ринит конъюнктивит геморрагический диатез нарушение координации движений). Лечение: симптоматическое при угнетении ЦНС кофеин никетамид.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственные средства угнетающие ЦНС усиливают действие. Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность лекарственных средств метаболизирующихся в печени (в т.ч. производные кумарина гризеофульвин глюкокортикостероиды пероральные контрацептивы), усиливает действие местноанестезирующих анальгезирующих и снотворных лекарственных средств.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В максимальной суточной дозе препарата содержится 33 г абсолютного этилового спирта и фенобарбитал поэтому пациентам принимающим Корвалол не рекомендуется заниматься деятельностью связанной с повышенным вниманием и требующим быстроты психических и двигательных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.