Инструкция по применению
Корвалол Гиппократ Капли 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Гиппократ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат

Состав

Действующие вещества: Этилбромизовалерианат - 2,00 г Фенобарбитал - 1,826 г Мяты перечной листьев масло - 0,142 г Вспомогательные вещества: Натрия гидроксид - 0,315 г Этанол (этиловый спирт) 95 % - 58 мл Вода очищенная - до 100 мл

Форма выпуска

Капли

Показания

Корвалол назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушением засыпания, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, а в качестве спазмолитического средства - при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Дозировка устанавливается индивидуально. Внутрь перед приемом пищи предварительно растворив в небольшом количестве (30-40) воды, 2-3 раза в день. Разовая доза при необходимости (например, при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 кап. Детям - по 3-15 капель в сутки (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания). Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек и/или печени, период лактации (при необходимости назначения препарата в период кормления следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания), беременность.

Побочные действия

Сонливость, головокружение, замедление сердечного ритма, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции. При длительном применении - явление бромизма, привыкание, лекарственная зависимость, синдром "отмены".

Передозировка

Симптомы: угнетение ЦНС, нистагм, атаксия, снижение АД, нарушения формулы крови, возбуждение, хроническая интоксикация бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координаций движений). Лечение: симптоматическое, при угнетении ЦНС - кофеин, никетамид.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственные средства, угнетающие ЦНС усиливают действие. Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность лекарственных средств, метаболизирующихся в печени (в т.ч. производные кумарина, гризеофульвин, глюкокортикостероиды, пероральные контрацептивы), усиливает действие местноанестезирующих, анальгезирующих и снотворных препаратов.

Особые указания

Препарат содержит 58 объемных % этанола и Фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.