Инструкция по применению
Корвалол Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20 мг+ 18,26 мг

Описание

Капли для приема внутрь ;в виде прозрачной жидкости с ароматным специфическим запахом.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат

Состав

Капли - 1 мл: Активные вещества: этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты 20 мг, фенобарбитал 18.26 мг. Вспомогательные вещества: этанол 95%, натрия гидроксид, масло мяты перечной, вода очищенная. 25 мл - флакон-капельницы.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Показания

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства при следующих заболеваниях: функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД); бессонница (нарушение засыпания); невротические состояния; вегетативная лабильность; раздражительность; ипохондрический синдром. В качестве спазмолитического средства: спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Способ применения и дозы

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза/сут. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель. Детям ;- по 3-15 капель/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания). Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально. Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза/сут. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель. Детям ;- по 3-15 капель/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания). Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Гиперчувствительность; тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность; период лактации (грудное вскармливание).

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости назначения Корвалола в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. С осторожностью применяют при беременности. Применение у детей Применение возможно согласно режиму дозирования.

Побочные действия

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции. При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C