Инструкция по применению
Корвалол Южфарм Таблетки 20 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 580 мкг+ 7,5 мг+ 8,2 мг

Описание

Таблетки белого или почти белого цвета с вкраплениями, круглой формы с плоской поверхностью, скошенные к краю с фасками.

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат

Состав

На одну таблетку:Активные вещества:Этилбромизовалерианат - 8,2 мг(этиловый эфир альфа - бромизовалериановой кислоты)Фенобарбитал - 7,5 мгМяты перечной листьев масло - 0,58 мгВспомогательные вещества:#-циклодекстрин - 55,55 мгКрахмал картофельный - 13,00 мгЛактозы моногидрат - 43,77 мгЦеллюлоза микрокристаллическая - 10,50 мгМагния стеарат - 0,90 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике этилбромизовалерианата и компонентов мяты перечной отсутствуют. При приеме внутрь фенобарбитал всасывается медленно, полностью. Максимальная концентрация в плазме крови определяется через 1-2 ч, связь с белками плазмы 50 %, у новорожденных - 30-40 %. Метаболизируется в печени, индуцирует микросомальные ферменты печени изоферментами CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 (скорость ферментативных реакций возрастает в 10-12 раз). Кумулируется в организме. Период полувыведения составляет 2-4 дня. Выводится почками в виде глюкуронида. около 25 % в неизменном

Показания

Корвалол назначают в качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушением засыпания, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, в качестве спазмолитического средства при спазмах кишечника.

Способ применения и дозы

Для приема внутрь, до приема пиши, запивая водой.Взрослым, как правило, назначают по 1-2 таблетки препарата 2 раза в сутки.При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 3 таблеток.Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток.Дозировка и длительность лечения устанавливается врачом индивидуально для каждого больного.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек и/или печени, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применения препарата Корвалол при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано, так как препарат содержит фенобарбитал, который проникает через плаценту и обладает тератогенным действием, оказывает отрицательное влияние на формирование и дальнейшее функционирование центральной нервной системы плода и новорожденного, проникает в грудное молоко, возможно развитие физической зависимости у новорожденного. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания грудным молоком.

Побочные действия

Корвалол, как правило, хорошо переносится. В отдельных случаях может наблюдаться сонливость, легкое головокружение, замедление сердечного ритма, снижение способности к концентрации внимания, аллергическая реакция. Могут возникнуть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Указанные явления проходят при снижении дозы препарата или прекращении приема препарата.При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости, привыкания, синдрома "отмены", а также накопления брома в организме и развитие явлений бромизма (депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, гемморагический диатез, нарушение координации движений).Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: угнетение центральной нервной системы, нистагм, атаксия, снижение артериального давления, возбуждение, головокружение, слабость, хроническая интоксикация бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений).Лечение: прекращение приема препарата, промывание желудка и проведение симптоматической терапии, при угнетении ЦНС - кофеин, никетамид.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственные средства, угнетающие центральную нервную систему, усиливают действие препарата.Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность лекарственных средств, метаболизирующихся в печени (в т.ч. производные кумарина, гризеофульвин, глюкокортикостероиды, пероральные контрацептивы): усиливает действие местноанестезирующих, анальгезирующих и снотворных лекарственных средств.Препарат усиливает токсичность метотрексата. Действия препарата усиливается на фоне применения препаратов вальпроевой кислоты.

Особые указания

Опыт применения препарата у детей до 18 лет отсутствует.Во время применения препарата не следует употреблять алкоголь.Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:Препарат содержит фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищённом от света месте, при температуре не выше 25 оС.Хранить в недоступном для детей месте.