
Инструкция по применению
Корвалол-МФФ Капли для приема внутрь 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат

Состав

Действующее вещество: Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал+ Этилбромизовалерианат (Menthae piperitae foliorum oleum + Phenobarbital + Ethylbromisovalerinate)Концентрация действующего вещества (мг): Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты 2 г, фенобарбитал 1, 826 г, спирт этиловый 95% 79 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

В качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства:функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы;неврозоподобные состояния, сопровождающиеся повышенной раздражительностью;нарушения засыпания; тахикардия;состояния возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями.В качестве спазмолитического средства:спазмы кишечника.

Способ применения и дозы

Внутрь. Дозировка устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15–30 капель 3 раза в день до еды. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40–50 капель. Детям назначают по 3–15 капель в сутки в зависимости от возраста и клинической картины заболевания.Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата;выраженные нарушения функции почек и/или печени.

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости назначения Корвалола в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.С осторожностью применяют при беременности.

Побочные действия

Корвалол, как правило, хорошо переносится. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение.При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают: депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не отмечено.

Особые указания

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей