Инструкция по применению
Кралонин Капли для приема внутрь гомеопатические 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется при ишемической болезни сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии. Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 100 г): Активные компоненты: Crataegus Ø 70 г, Spigelia anthelmia D2 1 г, Kalium carbonicum D3 1 г. Вспомогательные вещества: этиловый спирт (этанол) 96 % (об.), вода очищенная. Содержание этанола в препарате около 45 % (по объему).

Форма выпуска

Капли

Показания

Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии. Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.

Способ применения и дозы

По 10-20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Коррекцию дозы проводит врач. Курс лечения 2-3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Гомеопатические препараты не должны применяться в течение длительного времени без консультации с врачом.

Противопоказания

Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет. Применение лекарственного средства при сердечной недостаточности возможно только после консультации с врачом. С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях могут наблюдаться временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение частоты пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые ощущения в области желудка.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании. Данное лекарственное средство не заменяет препаратов, назначенных лечащим врачом.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит около 0,24 г абсолютного спирта этилового (этанола). Максимальная суточная доза препарата (60 капель) содержит около 0,72 г абсолютного спирта этилового (этанола). Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте! 3 года. Не применять по истечении срока годности.