Инструкция по применению
Креон 10000 Капсулы кишечнорастворимые 10000 ЕД 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Abbott Laboratories
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Панкреатин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 10000 ЕД



Описание

Капсулы кишечнорастворимые твердые желатиновые, размер №2, с бесцветным прозрачным корпусом и коричневой непрозрачной крышечкой, содержимое капсул - минимикросферы светло-коричневого цвета.

Действующее вещество

Панкреатин

Состав

Панкреатин, макрогол 4000 - 37.5 мг, гипромеллозы фталат - 56.34 мг, диметикон 1000 - 1.35 мг, цетиловый спирт - 1.18 мг, триэтилцитрат - 3.13 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Заместительная терапия недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы у детей и взрослых, обусловленной разнообразными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и наиболее часто встречающейся при: * муковисцидозе; * хроническом панкреатите; * после операции на поджелудочной железе; * после гастрэктомии; * раке поджелудочной железы; * частичной резекции желудка (например, Бильрот II); * обструкции протоков поджелудочной железы или общего желчного протока (например, вследствие новообразования); * синдроме Швахмана-Даймонда; * состоянии после приступа острого панкреатита и возобновлении энтерального или перорального питания. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случаях погрешностей в питании (употребление жирной пищи, переедание, нерегулярное питание и т.д.). К неприятным симптомам нарушения пищеварения относятся: * Тяжесть в животе, * дискомфорт после еды * взутие или метеоризм, * нарушение стула (диарея).

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.

Побочные действия

Аллергические реакции, редко — диарея, запор, ощущения дискомфорта в области желудка, тошнота.