Инструкция по применению
Кром-аллерг капли глазные флаконкапли 2% 10мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кромоглициевая кислота
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.02
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Кромоглициевая кислота

Состав

1 мл капель глазных содержит: Кромогликат натрия 20,00 мг .Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата моногидрат, полисорбат 80, сорбитол, динатрия эдетата дигидрат, бензалкония хлорид, вода очищенная

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Абсорбция через слизистую оболочку глаза незначительна. Системная биодоступность - менее 0,03 %. Период полувыведения (T1/2) - 5 - 10 мин.

Показания

Лечение (в составе комплексной терапии) и профилактика аллергических конъюнктивитов:Острых.Хронических.Для облегчения и снятия раздражений слизистой оболочки глаз, связанных с аллергическими реакциями:На факторы окружающей среды и средства бытовой химии.На профессиональные вредности, в том числе дым, запыленность, пары растворителей и других химических веществ.На действие косметических средств и лекарственных препаратов.На растения и домашних животных.

Способ применения и дозы

Местно.Лечение:Взрослым и детям закапывают по 1-2 капли препарата 4 раза в сутки (максимально до 6 раз) в нижний конъюнктивальный мешок пораженного глаза, через равные интервалы времени.Длительность применения 7 дней при аллергическом сезонном конъюнктивите и до 4-х недель при хроническом аллергическом конъюнктивите.Профилактика:Взрослым и детям закапывают по 1 капле препарата 4 раза в сутки в нижний конъюнктивальный мешок глаза, через равные интервалы времени.Применение начинают за 7-10 дней до возможного развития сезонного аллергического конъюнктивита и продолжают еще в течение 7-10 дней после исчезновения симптомов заболевания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Детский возраст до 4-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Активное вещество препарата может выделяться с грудным молоком, однако неблагоприятное воздействие на ребенка маловероятно из-за незначительной системной абсорбции. Применение в период лактации возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.В исследованиях на животных при парентеральном введении в высоких дозах наблюдалось снижение веса плода.

Побочные действия

Местные реакции: временное нарушение четкости зрительного восприятия, ощущение жжения в глазу, поверхностное поражение эпителия роговицы (в каплях содержится консервант - бензалкония хлорид).Аллергические реакции: зуд, легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы. Прочие реакции: в единичных случаях - тошнота.

Взаимодействие с другими препаратами

Кромоглициевая кислота может снижать потребность в применении офтальмологических препаратов, содержащих ГКС.

Особые указания

Глазные капли Кром-аллерг содержат консервант бензалкония хлорид, поэтому лицам, носящим контактные линзы, следует удалить их перед применением капель и установить снова не ранее, чем через 15 мин.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения препаратом Кром-аллерг необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей