Инструкция по применению
Ксефокам таблетки покрытые оболочкой 4мг N10

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Такеда Фармасьютикалс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лорноксикам
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 4 мг

Действующее вещество

Лорноксикам

Состав

1 таб. лорноксикам 4 мг. Вспомогательные вещества: магния стеарат, повидон К25, натрия кроскармеллоза, целлюлоза, лактозы моногидрат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

кратковременное лечение болевого синдрома различного происхождения, симптоматическая терапия ревматических заболеваний (ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, ревматическое поражение мягких тканей).

Противопоказания

полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в т.ч. в анамнезе), геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, недавно перенесенные операции, сопряженные с риском кровотечения или неполного гемостаза, период после проведения аортокоронарного шунтирования, эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение, рецидивирующая язва желудка или повторные ЖКТ кровотечения, ЖКТ кровотечения, связанные с приемом НПВП в анамнезе, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) в фазе обострения, декомпенсированная сердечная недостаточность, выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени, выраженная почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 300 мкмоль/л), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия, гиповолемия или обезвоживание, беременность, период лактации (грудного вскармливания), детский и подростковый возраст до 18 лет (из-за отсутствия клинических данных по его применению у этой возрастной группы), повышенная чувствительность/аллергия к лорноксикаму или к одному из компонентов препарата. С осторожностью: эрозивно-язвенные поражения и кровотечения из ЖКТ (в анамнезе)умеренно выраженная почечная недостаточность, КК менее 60 мл /минсостояния после хирургических вмешательств, ИБС, хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболеваниядислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерийналичие инфекции Helicobacter pylori, длительное применение НПВП, тяжелые соматические заболевания, одновременное применение пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогрела), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина), курение, алкоголизм, возраст старше 65 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, боль в животе, сухость во рту, стоматит, тошнота, рвота, изжога, диарея, ,эзофагит, гастрит, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка и кишечника в т.ч. с перфорацией и кровотечением, запор, метеоризм, мелена, нарушение функции печени, повышение уровня печеночных трансаминаз. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, нарушения сна, депрессия, возбуждение, тремор, асептический менингит, парестезии. Со стороны органов чувств: шум в ушах, нарушение зрения. Со стороны сердечно-сосудистой системы: развитие или усугубление сердечной недостаточности, тахикардия, повышение АД. Со стороны органов дыхания: фарингит, ринит, диспноэ, кашель, бронхоспазм. Со стороны мочевыделительной системы: дизурия, снижение клубочковой фильтрации, интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, папиллярный некроз, нефротическнй синдром, периферические отеки, острая почечная недостаточность. Со стороны кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки: отечный синдром, экхимозы, кожная сыпь, зуд, крапивница, алопеция, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, ангионевротический отек. Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: агранулоцитоз, лейкопения, анемия, тромбоцитопения, увеличение времени кровотечения. Прочие: анорексия, усиление потоотделения, изменение массы тела, артралгии, миалгии.