Инструкция по применению
Ксилометазолин Капли назальные 0,1% 15 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Славянская аптека
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%



Описание

Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

Действующее вещество

Ксилометазолин

Состав

Состав на 1 мл: Действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид 0,50 мг 1,00 мг Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0,15 мг 0,15 мг динатрия эдетата дигидрат (Трилон Б) 0,50 мг 0,50 мг натрия гидрофосфата додекагидрат 7,13 мг 7,13 мг калия дигидрофосфат 3,63 мг 3,63 мг натрия хлорид 9,00 мг 9,00 мг вода очищенная до 1 мл до 1 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Интраназально. Для 0,1 % раствора: У детей старше 6 лет и взрослых: по 2-3 капли в каждый носовой ход 0,1% раствора 2-3 раза в сутки. Для 0,05% раствора: У детей в возрасте от 2 до 6 лет: по 1-2 капли в каждый носовой ход 0,05% раствора 1 -2 раза в сутки, не более 3 раз в сутки, у детей в возрасте старше 6 лет: по 2- 3 капли в каждый носовой ход 0,05% раствора 2-3 раза в сутки. Не следует применять препарат более 3 раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из вспомогательных веществ препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, гипертиреоз, атрофический ринит, воспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия носа, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), состояние после транссфеноидальной гипофизэктомии, беременность, применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) (включая 14 дней после их отмены), трициклических или тетрациклических антидепрессантов, детский возраст до 6 лет (для 0,1 % раствора), детский возраст до 2 лет (для 0,05% раствора).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности. В период грудного вскармливания препарат может применяться только в том случае,если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Ксилометазолин способен проникать в грудное молоко. Вследствие возможного снижения выработки молока не следует превышать рекомендованную дозу.

Побочные действия

Классификация частоты развития побочных эффектов (согласно рекомендациям ВОЗ): очень часто ≥1/10, часто от ≥1/100 до Нарушения со стороны иммунной системы: Нечасто: реакция гиперчувствительности (ангионевротический отёк, кожная сыпь, зуд). Нарушения со стороны центральной нервной системы (ЦНС): Очень редко - беспокойство, бессонница, утомляемость, вялость, апатия, парестезии, покалывание, головная боль, головокружение, галлюцинации и судороги (преимущественно у детей). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: Редко: ощущение "сердцебиения", тахикардия, повышение артериального давления, Очень редко: аритмия. Нарушения со стороны дыхательной системы: Часто - жжение, сухость слизистой оболочки носа, чихание, гиперсекреция слизистой оболочки носоглотки, Нечасто - после ослабления терапевтического эффекта повышенная отёчность слизистой оболочки носа, носовые кровотечения. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: Очень редко: тошнота. Редко: рвота. Нарушение со стороны органов чувств: Очень редко: нарушение четкости зрения. При возникновении вышеуказанных симптомов прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: Усиление побочных эффектов (дозозависимых), снижение температуры тела, спутанность сознания, повышенное потоотделение, головная боль, брадикардия, повышение артериального давления, угнетение дыхания, кома и судороги. После повышения артериального давления может наблюдаться его резкое снижение. Лечение: Симптоматическая терапия, при случайном приеме препарата внутрь - введение активированного угля, натрия сульфата (слабительное), промывание желудка. В серьёзных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения артериального давления, а также интубация и искусственная вентиляция лёгких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует применять одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы (МАО), тетра- и трициклическими антидепрессантами, другими местными сосудосуживающими средствами (деконгестантами), а так же препаратами, повышающими артериальное давление. При одновременном приеме ксилометазолина с ингибиторами МАО или в течение 14 дней после окончания их применения возможно повышение артериального давления и нарушение ритма сердца.

Особые указания

Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, применяющие Ксилометазолин, могут быть подвержены повышенному риску развития серьезных желудочковых аритмий. Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение и отек слизистой оболочки носа. Перед применением очистить носовые ходы. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей. Не рекомендуется применять препарат непрерывно более 7 дней. Применение препарата более 7 дней может вызвать эффект "рикошета" (медикаментозный ринит). Избегать попадания препарата в глаза.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Ксилометазолин в терапевтических дозах не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. При развитии нежелательных реакций следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.