Инструкция по применению
Ксимедон Таблетки 250 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-розового цвета или светло-розового с желтоватым оттенком цвета с вкраплениями более интенсивного оттенка, с фаской и риской с одной стороны.

Действующее вещество

Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин

Состав

1 таблетка содержит: _Действующее вещество:_ гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин - 250 мг. _Вспомогательные вещества:_ крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При пероральном приеме гидроксиэтилдиметилдигидропиримидина происходит быстрое всасывание его в течение 0,5-1 ч, максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 1,7 ч. Период полувыведения препарата составляет 5,5 ч. В результате низкого процента связывания с сывороточным альбумином (9 %) и отсутствием биотрансформации в организме препарат не оказывает конкурентного действия при приеме других лекарственных средств.

Показания

В комплексной терапии следующих заболеваний: * глубокие и поверхностные ожоги (подготовка больных к аутодермопластике), * длительно незаживающие раны, * трофические язвы, * язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, * пролежни, * отморожения, * гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей, * хронический остеомиелит, * стрептококковые инфекции (ангина, рожа), * микробная экзема, * псориаз, * вирусные гепатиты, * туберкулез легких, * пневмония, * хронический бронхит, * хронический кистозный синусит, * сальмонеллез, * ревматизм, * тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей, * до- и послеоперационные периоды для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды. При глубоких и поверхностных ожогах (подготовке больных к аутодермопластике) - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 20 дней. При проведении кожно-пластических операций препарат назначают до и после операции по 10 дней. При длительно незаживающих ранах, трофических язвах, пролежнях - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 25-30 дней. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 500 мг (2 таблетки) 2 раза в день курсом 12 дней. При отморожениях - по 250-500 мг (1-2 таблетки) 3-4 раза в день в течение 2-5 недель. При гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей и костей - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10-30 дней. При хроническом остеомиелите - до и после операции по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 20-25 суток. Повторные курсы лечения проводят через 6 месяцев на протяжении 1,5 лет. При ангине, роже - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7-10 дней. При микробной экземе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней. При псориазе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-3 недель. При вирусных гепатитах В и С - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней. При туберкулезе легких - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 2 месяцев. При пневмонии и хроническом бронхите - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 18-21 дня. При хроническом кистозном синусите - по 250-500 мг (1-2 таблетки) 4 раза в день в течение 1 месяца. При сальмонеллезе - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7 дней. При ревматизме - по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 3-4 недель. В до- и послеоперационном периодах для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта - по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10-20 дней (с первого дня после операции или в дооперационный период 3-5 дней и далее с первого дня после операции).

Противопоказания

* Гиперчувствительность к гидроксиэтилдиметилдигидропиримидину и другим компонентам препарата, * лейкоз (острый и хронический), * эритремия, * детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период лечения необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Нет данных

Побочные действия

Возможны - диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка

В связи с малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия гидроксиэтилдиметилдигидропиримидина случаев токсических проявлений не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместимость Ксимедона® с какими-либо лекарственными препаратами не выявлена. Можно комбинировать с анаболическими стероидами, химическими и биологическими антисептиками.

Особые указания

Нет данных Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.