Инструкция по применению
Ксимедон Таблетки 250 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидроксиэтилдиметилдигидро-пиримидин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Таблетки от белого с кремоватым оттенком до светло-розового с кремоватым оттенком цвета с вкраплениями более интенсивного оттенка, круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Действующее вещество

Гидроксиэтилдиметилдигидро-пиримидин

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин - 0,2500 г. Вспомогательные вещества: кальция стеарат - 0,0009 г, крахмал картофельный - 0,0446 г, тальк - 0,0045 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При пероральном приеме гидроксиэтилдиметилдигидропиримидина происходит быстрое всасывание его в течение 0,5-1 ч, максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 1,7 ч. Период полувыведения препарата составляет 5,5 ч. В результате низкого процента связывания с сывороточным альбумином (9 %) и отсутствием биотрансформации в организме препарат не оказывает конкурентного действия при приеме других лекарственных средств.

Показания

В комплексной терапии следующих заболеваний: глубокие и поверхностные ожоги (подготовка больных к аутодермопластике), длительно незаживающие раны, трофические язвы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пролежни, отморожения, гнойновоспалительные заболевания мягких тканей и костей, хронический остеомиелит, стрептококковые инфекции (ангина, рожа), микробная экзема, псориаз, вирусные гепатиты, туберкулез легких, пневмония, хронический бронхит, хронический кистозный синусит, сальмонеллез, ревматизм, тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей, до- и послеоперационные периоды для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды. При глубоких и поверхностных ожогах (подготовке больных к аутодермопластике) - по 0,5 г 3 раза в сутки в течение 20 дней. При проведении кожно-пластических операций препарат назначают до и после операции по 10 дней. При длительно незаживающих ранах, трофических язвах, пролежнях - по 0,5 г 3 раза в день в течение 25-30 дней. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - по 0,5 г 2 раза в сутки курсом 12 дней. При отморожениях - по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день в течение 2-5 недель. При гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей и костей - по 0,5 г 4 раза в день в течение 10-30 дней. При хроническом остеомиелите - до и после операции по 0,5 г 4 раза в день в течение 20-25 суток. Повторные курсы лечения проводят через 6 месяцев на протяжении 1,5 лет. При ангине, роже - по 0,5 г 3 раза в день в течение 7-10 дней. При микробной экземе - по 0,5 г 3 раза в день в течение 10 дней. При псориазе - по 0,5 г 3 раза в день в течение 2-3 недель. При вирусных гепатитах В и С - по 0,5 г 3 раза вдень в течение 10 дней. При туберкулезе легких - по 0,5 г 4 раза в день в течение 2 месяцев. При пневмонии и хроническом бронхите - по 0,5 г 4 раза в день в течение 18-21 дня. При хроническом кистозном синусите - по 0,25-0,5 г 4 раза в день в течение 1 месяца. При сальмонеллезе - по 0,5 г 3 раза в день в течение 7 дней. При ревматизме - по 0,5 г 3 раза в день в течение 3-4 недель. В до- и послеоперационные периодах для профилактики гнойновоспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта - по 0,5 г 4 раза в день в течение 10-20 дней (с первого дня после операции или в дооперационный период 3-5 дней и далее с первого дня после операции).

Противопоказания

Гиперчувствительность. Лейкоз (острый и хронический), эритремия, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В период лечения необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны - диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка

В связи с малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия Ксимедона случаев токсических проявлений не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместимость Ксимедона с какими-либо лекарственными препаратами не выявлена. Можно комбинировать с анаболическими стероидами, химическими и биологическими антисептиками.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25гр.С. Хранить в недоступном для детей месте.