Инструкция по применению
Кудесан Раствор флакон-капельница 3 % 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Убидекаренон
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Убидекаренон

Состав

Действующее вещество: Убидекаренон (Ubidecarenone)Концентрация действующего вещества (мг): 30

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Взрослые: -Для профилактики и в составе комплексной терапии различных заболеваний сердечно-сосудистой системы: - хроническая сердечная недостаточность - дилатационная кардиомиопатия - ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда (в период восстановительной терапии), - аритмии, - артериальная гипертензия, - период подготовки к проведению операций на сердце (аортокоронарное шунтирование, при пороках сердца). Дети (с 1 года): Для профилактики и в составе комплексной терапии: заболеваний сердечно-сосудистой системы:- аритмии,- хроническая сердечная недостаточность,- дилатационная кардиомиопатия,- период подготовки к проведению операций на сердце (врожденные и приобретенные пороки);заболеваний желудочно-кишечного тракта:- хронический гастродуоденит;заболеваний почек:- хронический пиелонефрит,- метаболическая нефропатия;заболеваний нервной системы (в том числе наследственных нейродегенеративных заболеваний):- мигрень,- расстройства вегетативной нервной системы (нейро-циркуляторная дистония),- митохондриальная энцефаломиопатия (MELAS синдром), синдром Лейга,- туберозный склероз,- врожденные миопатии, мышечные дистрофии.В комплексной терапии заболеваний, связанных с нарушением обменных процессов:- астенический синдром- восстановительный период после тяжелых заболеваний и хирургических вмешательствВзрослые и дети (с 1 года):- для профилактики и восполнения недостаточности коэнзима Q10- для улучшения адаптации к повышенным физическим нагрузкам у спортсменов.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 14 лет по 10-11 капель (0,5 мл) 1 раз в день во время еды, предварительно растворив в небольшом количестве воды или иного напитка. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется назначать при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием достаточного опыта клинического применения.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Очень редко: тошнота, диарея.

Передозировка

Случаев передозировки препарата Кудесан не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение гиполипидемических средств (статины, фибраты), бета-адреноблокаторов (атенолол, метопролол, пропранолол), трициклических антидепрессантов может приводить к снижению концентрации убидекаренона в плазме крови.Убидекаренон может потенцировать действие дилтиазема, метопролола, эналаприла и нитратов, а также уменьшать действие варфарина.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортом и работать с механизмами: Нет данных.