Инструкция по применению
Кудесан Форте Раствор 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Русфик
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Убидекаренон
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Описание

Прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета с легкой опалесценцией.

Действующее вещество

Убидекаренон

Состав

1 мл препарата содержит: Действующее вещество: убидекаренон - 30,0 мг
Вспомогательные вещества: DL- альфа-токоферола ацетат, аскорбил пальмитат, макрогол глицерилгидроксистеарат, натрия бензоат, лимонная кислота моногидрат, вода очищенная.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В составе комплексной терапии: У взрослых: хроническая сердечная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда (в период восстановительной терапии), аритмии, артериальная гипертензия. У детей с 1 года: хроническая сердечная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия, аритмии, хронический гастродуоденит, хронический пиелонефрит, метаболическая нефропатия, мигрень, нейро-циркуляторная дистония, наследственные нейродегенеративные заболевания (митохондриальная энцефаломиопатия (MELAS синдром), синдром Лейга, туберозный склероз), врожденные миопатии, мышечные дистрофии, заболевания, связанные с нарушением обменных процессов (астенический синдром, восстановительный период после тяжелых заболеваний и хирургических вмешательств). Период подготовки к проведению операций на сердце (аорто-коронарное шунтирование, врожденные и приобретенные пороки) у взрослых и детей с 1 года по рекомендации врача. Для улучшения адаптации к повышенным физическим нагрузкам у взрослых и детей с 1 года. Для профилактики и восполнения недостаточности коэнзима Q10 у взрослых и детей с 1 года.

Способ применения и дозы

Препарат Кудесан, следует принимать внутрь 1 раз в сутки во время приема пищи в первой половине дня, предварительно растворив в небольшом количестве кипяченой воды или ином напитке комнатной температуры. С целью профилактики и восполнения недостаточности коэнзима Q10 принимать в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице 1. Таблица 1 Возраст Капли, назначение в среднем Эквивалентное содержание коэнзима Q10, мг 1 год - 3 года 2-4 капли 3-6 мг 3 года - 7 лет 4-8 капель 6-12 мг 7-12 лет 8-12 капель 12-18 мг Дети старше 12 лет и взрослые 12-24 капель 18-30 мг В комплексной терапии различных заболеваний Кудесан, принимать в зависимости от возраста по всем заявленным показаниям в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице 2. Таблица 2 Возраст Капли, назначение в среднем Эквивалентное содержание коэнзима Q10, мг 1 год - 3 года 4-10 капель 6-15 мг 3 года - 7 лет 10-16 капель 15-24 мг 7-12 лет 16-20 капель 24-30 мг Дети старше 12 лет и взрослые 20-60 капель 30-90 мг Длительность курса применения препарата Кудесан, составляет 2-3 месяца. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам в связи с отсутствием достаточного опыта клинического применения.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Очень редко: тошнота, диарея.

Передозировка

Нет данных.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение гиполипидемических средств (статины, фибраты), бета-адреноблокаторов (атенолол, метопролол, пропранолол), трициклических антидепрессантов, может приводить к снижению концентрации убидекаренона в плазме крови. Убидекаренон может снижать действие варфарина. Убидекаренон может потенцировать действие дилтиазема, метопролола, эналаприла и нитратов.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет данных.

Условия хранения

В сухом месте