Инструкция по применению
Курадерм Крем 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Вануату
Производитель: Karuba Investments
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Салосодин+Салициловая кислота+Мочевина
Количество в упаковке: 1



Описание

лечение рака кожи

Действующее вещество

Салосодин+Салициловая кислота+Мочевина

Состав

гликозиды соласодина 0,001гр. салициловая кислота 2,0гр, мочевина 1,0гр.

Форма выпуска

Крем

Показания

Кератозы Кератоакантомы Солнечные и старческие пятна Базально-клеточный рак плоскоклеточный рак

Способ применения и дозы

Наносить на пораженные участки кожи МИНИМУМ 2 раза в сутки. В особых случаях, при многократном нанесение крема (до десяти раз в сутки) обеспечивается быстрое отхождение и очищение эрозий. Один раз в день, перед нанесением крема КУРАДЕРМ, необходимо применять антисептический раствор. Эта процедура позволяет обеспечить удаление отмерших клеток, которые могут мешать глубокому проникновению крема внутрь кожи. Нанесите небольшое количество крема КУРАДЕРМ только на пораженные участки кожи, затем наложите повязку, например, из компрессной бумаги. НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЭРОЗИИ ПОДСЫХАТЬ! В большинстве случаев, в ходе лечения наблюдаются покраснение и чувство жжения. Ощущение пощипывания, легкая боль могут возникать в течении 15-30 мин после каждого применения крема. Это нормальная реакция. Когда опухоль в зоне воздействия препарата спадет и здоровые клетки полностью заменят раковые клетки, лечение следует прекратить. Покраснение постепенно пройдет. В большинстве случаев лечение длится от 7 до 70 дней, в зависимости от размера и типа кожного поражения и индивидуальной чувствительности к препарату. В некоторых случаях лечение, возможно, будет длиться больше указанных сроков. Если есть сомнение в полном исчезновении поражения кожи, посоветуйтесь с врачом и в случае необходимости продлите лечение. Лечение проводится до полной регенерации ранее пораженного участка кожи. Перед применением препарата КУРАДЕРМ обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ограничения по площади воздействия Общая площадь кожи, единовременно обрабатываемой препаратом КУРАДЕРМ, не должна превышать 25 см2 (примерно 5х5см). Если площадь поражения кожи составляет более 25 см2, то ее следует последовательно лечить участками.

Противопоказания

Не наносите крем КУРАДЕРМ на меланомы, родимые пятна и сильно пигментированные эрозии. Если Вы не уверены в природе новообразования кожи, обратитесь к врачу. Влияние препарата КУРАДЕРМ на беременность не изучено, таким образом, рекомендуем отказаться от использования препарата при беременности. Также КУРАДЕРМ противопоказан людям с повышенной чувствительностью к баклажану и любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Наиболее часто наблюдаемые побочные реакции - пощипывание, боль и чувство жжения в местах нанесения препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие КУРАДЕРМ с другими препаратами местного действия не установлено.

Особые указания

КУРАДЕРМ содержит компоненты, обладающие местным раздражающим действием (салициловая кислота и мочевина), поэтому не следует допускать контакта препарата с слизистыми оболочками глаза. Лечение зон около слизистых глаз и рта следует проводить с особой осторожностью. После применения препарата следует вымыть руки.