Инструкция по применению
Куриозин Гель 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка гиалуронат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.103%
Срок годности: 24.0



Действующее вещество

Цинка гиалуронат

Состав

1 г содержит: Активное вещество: гиалуронат цинка 1. 03 мг. Вспомогательные вещества: калия сорбат , 0. 015 г, натрия гидроксид , 0. 03 г, карбомер , 0. 15 г, вода ди , до 15 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Уровень гиалуроновой кислоты в сыворотке составляет 10–100 мкг/л у здоровых добровольцев, повышается в утренние часы, при расстройствах функции печени и в пожилом возрасте. T1/2 составляет 2,5–5,5 ч. Суточное выделение эндогенной гиалуроновой кислоты происходит через почки.

Показания

Местное лечение всех форм акне легкой и средней степени тяжести, в первую очередь комедонов и папуло-пустулезных угрей.

Способ применения и дозы

Наружно. Гель наносят 2 раз в сутки на пораженные участки кожи тонким слоем после предварительного ее очищения. Препарат всасывается в течение нескольких минут и не требует применения повязки. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и тяжести заболевания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о применении во время беременности и кормления грудью отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите своему врачу или фармацевту о каких-либо принимаемых в недавнем прошлом или в настоящее время препаратах, включая препараты, отпускаемые без рецепта. Взаимодействий с другими лекарственными препаратами и другие формы взаимодействий не отмечались.

Особые указания

Управление автотранспортом и другими механизмами Гель Куриозин не влияет на способность управлять автотранспортом и другими механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей