Инструкция по применению
Кутис Композитум ампулы 2,2 мл 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 ампула содержит: Активные вещества: Cutis suis (кутис суис) D8 22 мкл, Hepar suis (гепар суис) D10 22 мкл, Splen suis (сплен суис) D10 22 мкл, Placenta totalis suis (плацента тоталис суис) D10 22 мкл, Glandula suprarenalis suis (гляндула супрареналис суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D10 22 мкл, Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталис (туя)) D8 22 мкл, Galium aparine (галиум апарине) D6 22 мкл, Selenium (селениум) D10 22 мкл, Thallium sulfuricum (талиум сульфурикум) D13 22 мкл, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии (игнатия)) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D10 22 мкл, Cortisonum aceticum (кортизонум ацетикум) D28 22 мкл, Urtica urens (Urtica) (уртика уренс (уртика)) D4 22 мкл, Acidum phosphoricum (ацидум фосфорикум) D6 22 мкл, Calcium fluoratum (кальциум флуоратум) D13 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (меркуриус солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (эскулюс гиппокаштанум (эскулюс)) D6 22 мкл, Ichthyolum (ихтиолум) D28 22 мкл, Sanguinarinum nitricum (Sanguinarinum nitricum crudum) (сангвинаринум нитрикум (сангвинаринум нитрикум крудум)) D6 22 мкл, Ledum palustre (Ledum) (ледум палюстре (ледум)) D4 22 мкл, Arctium lappa (Arctium) (арктиум лаппа (арктиум)) D6 22 мкл, Acidum formicicum (ацидум формицикум) D198 22 мкл, Pyrogeniun-Nosode (пирогениум-нозоде) D198 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum (ацидум альфа-кетоглутарикум) D10 22 мкл, Acidum fumaricum (ацидум фумарикум) D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум) (натриумдиэтилоксалацетат) D10 22 мкл. Вспомогательные вещества: натрия хлорид (для установления изотонии), вода д/и.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Лечение угревой сыпи (акне) умеренно выраженной и средней тяжести.

Способ применения и дозы

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения - 4 недели.

Противопоказания

Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных); повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение. При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.