Инструкция по применению
Квамател мини таблетки покрытые пленочной оболочкой 10мг N14

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фамотидин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

Таблетки Квамател содержат фамотидин, который уменьшает объем желудочного сока и содержание соляной кислоты в нем, повышает pH содержимого желудка.

Действующее вещество

Фамотидин

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: фамотидин 10 мг, Вспомогательные вещества: диоксид кремния коллоидный, стеарат магния, повидон К90, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), тальк, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика носит линейный характер. Всасывание. После приема внутрь абсорбируется из ЖКТ не полностью. Cmax достигается через 1-3 ч и составляет 0.07-0.1 мг/л. Биодоступность - 40-45%, увеличивается при одновременном приеме пищи и снижается при одновременном приемеантацидов. Распределение. Связывание с белками плазмы составляет 10-20%. Проникает через плацентарный барьер и через ГЭБ. Выделяется с грудным молоком. Метаболизм. 30-35% препарата метаболизируется в печени с образованием S-оксида. Выведение. T1/2 составляет 2.3-3.5 ч. После приема внутрь 30-35% фамотидина, а после в/в введения 65-70% фамотидина выводится с мочой в неизменном виде.

Показания

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка в фазе обострения, симптоматические язвы и их профилактика, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера-Эллисона, предупреждение аспирации желудочного сока при проведении общей анестезии (синдром Мендельсона), кровотечения из верхних отделов ЖКТ (в составе комплексного лечения).

Способ применения и дозы

Внутрь, целиком, запивая небольшим количеством воды. В случае появления изжоги или других симптомов диспепсии следует принять 1 таблетку препарата Квамател Мини. Не следует применять более 2 таблеток в сутки.

Противопоказания

Беременность, период лактации (грудного вскармливания), детский возраст, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к другим блокаторам гистаминовых H2-рецепторов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, запор, диарея, снижение аппетита, повышение активности трансаминаз печени, гепатоцеллюлярный, холестатический или смешанный гепатит, острый панкреатит. Со стороны системы кроветворения: очень редко - агранулоцитоз, панцитопения, лейкопения, тромбоцитопения, гипо- или аплазия костного мозга. Аллергические реакции: крапивница, кожная сыпь, зуд, бронхоспазм, ангионевротический отек, анафилактический шок. Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, брадикардия, AV-блокада, снижение АД. Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, галлюцинации, спутанность сознания, повышенная утомляемость, депрессия, возбуждение, тревога. Со стороны органов чувств: снижение остроты зрения, шум в ушах. Со стороны половой системы: при длительном применении в высоких дозах - гиперпролактинемия, гинекомастия, аменорея, снижение либидо. Со стороны костно-мышечной системы: артралгия, мышечные спазмы. Дерматологические реакции: алопеция, обыкновенные угри, сухость кожи, токсический эпидермальный некролиз. Прочие: лихорадка.

Передозировка

Симптомы: рвота, двигательное возбуждение, тремор, снижение АД, тахикардия, коллапс. Лечение: промывание желудка, симптоматическая и поддерживающая терапия, гемодиализ.

Взаимодействие с другими препаратами

Вследствие повышения pH содержимого желудка Квамател при одновременном применении уменьшает всасывание кетоконазола и итраконазола, увеличивает всасывание амоксициллина и клавулановой кислоты. Антациды и сукральфат, применяемые одновременно с Квамателом, замедляют абсорбцию фамотидина. При одновременном приеме Квамателa и препаратов, угнетающих костномозговое кроветворение, увеличивается риск развития нейтропении.

Особые указания

Применение Квамателa может маскировать симптомы рака желудка, поэтому прежде, чем приступить к лечению фамотидином, необходимо исключить наличие злокачественного новообразования. При резком прекращении лечения фамотидин может вызвать синдром отмены, поэтому лечение прекращают, постепенно снижая его дозу.