Инструкция по применению
Квинизол таблетки 500мг N10

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Розлекс Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Орнидазол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Описание

Таблетки Квинизол - противопротозойный и противомикробный препарат, производное 5-нитроимидазола. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы орнидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа орнидазола взаимодействует с ДНК клетками микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий.

Действующее вещество

Орнидазол

Состав

Одна таблетка содержит: Действующее вещество: орнидазол - 500,0 мг.
Вспомогательные вещества (ядро): целлюлоза микрокристаллическая 35,0 мг, крахмал 45.0 мг, кроскармеллоза натрия 10.0 мг, тальк 6.0 мг, стеарат магния 3,0 мг.
Вспомогательные вещества (оболочка): гипромеллоза 10,12 мг, макрогол 1,0125 мг. тальк 8.0 мг, диоскид титана 2,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Трихомониаз (мочеполовые инфекции у женщин и мужчин, вызванные Trichomonas vaginalis), амебиаз (все кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolica, в том числе амебная дизентерия, и все кишечные формы амебиаза, особенно амебный абсцесс печени), лямблиоз. Профилактика анаэробных инфекций при операциях на толстой кишке и при гинекологических вмешательствах.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь после еды, запивая достаточным количеством воды. Трихомониаз. Взрослым и детям с массой тела более 35 кг по 1 таблетке 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5 дней. Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер во всех случаях должен получить такой же курс лечения. Суточная доза для детей с массой 20-35 кг составляет 25 мг/кг массы тела и назначается в один прием, в течение 5 дней. Амёбиаз. Схемы лечения: трехдневный курс лечения больных с амебной дизентерией и 5-10 дневной курс лечения при всех формах амебиаза. Длительность лечения 3 дня. Взрослые и дети с массой тела более 35 кг - 3 таблетки в один прием вечером. При массе тела более 60 кг - 4 таблетки (по 2 таблетки утром и вечером). Дети старше 3 лет и с массой тела 20-35 кг - 40 мг/кг массы тела в один прием. Длительность лечения 5-10 дней. Взрослые и дети с массой тела более 35 кг - 2 таблетки (по 1 таблетке утром и вечером). Дети старше 3 лет и с массой тела 20-35 кг - 25 мг/кг массы тела в один прием. Лямблиоз. Взрослые и дети с массой тела более 35 кг: 3 таблетки однократно вечером. Дети с массой тела 20-35 кг: 40 мг/кг один раз в сутки. Продолжительность лечения составляет 1 -2 дня. Профилактика анаэробной инфекции при операциях По 0,5-1 г за 1-2 ч до операции, после операции - по 0.5 г 2 раза в сутки в течение 3-5 дней.

Применение при беременности и кормлении грудью

Орнидазол противопоказан к применению в I триместре беременности и в период грудного вскармливания. В эксперименте орнидазол не оказывает тератогенного или токсического действия на плод. Поскольку контролированные исследования у беременных женщин не проводились, применять орнидазол во II и III триместрах беременности возможно только по абсолютным показаниям, когда возможные преимущества его применения для матери превышают потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период грудного вскармливания, следует прекратить грудное вскармливание. Возобновление грудного кормления возможно не ранее, чем через 48 часов после приема последней дозы препарата.

Побочные действия

Побочные эффекты систематизированы с использованием следующей классификации: Очень часто (> 1/10) Часто (> 1/100 - 1 /1000 - 1/10000 -< 1/1000) Очень редко (< 1 /10000) Нарушения со стороны нервной системы: часто - головная боль, сонливость, усталость, головокружение, редко - временная потеря сознания, тремор, ригидность мышц, нарушение координации движения, судороги, сенсорная или смешанная периферическая нейропатия, очень редко - изменение вкусовых ощущений. Нарушение со стороны крови и лимфатической системы: нечасто - угнетение костномозгового кроветворения, нейропатия. Нарушение со стороны пищеварительной системы: очень часто - тошнота, рвота, металлический привкус во рту, редко — диарея, изменение активности «печеночных» ферментов, потеря аппетита. Нарушение со стороны иммунной системы: нечасто - реакции гиперчувствительности, кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке.

Взаимодействие с другими препаратами

В отличие от других производных нитроимидазола, орнидазол не ингибирует ацетальдегиддегидрогеназу, и не является поэтому несовместимым с алкоголем. Орнидазол усиливает действие непрямых антикоагулянтов кумаринового ряда, что требует соответствующей коррекции их дозы. Удлиняет миорелаксирующее действие векурония бромида. Совместный прием с фенобарбиталом или другими индукторами печеночных ферментов уменьшает период полувыведения орнидазола из плазмы крови. При совместном применении орнидазола с ингибиторами микросомальных ферментов печени (например, циметидин) отмечается повышение концентрации орнидазола.

Особые указания

Противопоказания: повышенная чувствительность к орнидазолу, вспомогательным веществам и другим производным нитроимидазола, детский возраст до 3 лет, и масса тела менее 20 кг, I триместр беременности, период грудного вскармливания, органические заболевания центральной нервной системы, патологические изменения крови и аномалии клеток крови. С осторожностью Нарушения функции печени, алкоголизм, пациенты пожилого возраста, беременность II и III триместр, детям старше 3 лет и массой тела больше 20 кг, пациентам пожилого возраста.