Инструкция по применению
Лаципил таблетки покрытые оболочкой 2мг N14

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лацидипин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 2 мг

Действующее вещество

Лацидипин

Состав

Лацидипин 2 мг.; Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, лактозы моногидрат (сухой спрей), повидон К30, магния стеарат, гипромеллоза, Opaspry белый.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание;После приема внутрь лацидипин быстро абсорбируется из ЖКТ. Абсолютная биодоступность составляет приблизительно 10%. Cmax достигается через 30-150 мин.; Распределение;Связывание лацидипина с белками плазмы составляет более 95% (с альбумином и 1-гликопротеином).; Метаболизм;Лацидипин подвергается интенсивному метаболизму при "первом прохождении" через печень. Метаболизируется в печени с образованием 4 основных метаболитов, обладающих незначительной фармакологической активностью. Нет данных, подтверждающих способность лацидипина индуцировать или ингибировать активность печеночных ферментов.; Выведение;При достижении равновесного состояния средняя величина T1 /2 лацидипина составляет 13-19 ч.; Примерно 70% от принятой дозы лацидипина выводится в виде метаболитов через кишечник, остальная часть дозы - в виде метаболитов с мочой.

Показания

Артериальная гипертензия в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с другими антигипертензивными средствами (в т.ч. с бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами АПФ).

Способ применения и дозы

Дозы устанавливают с учетом тяжести течения заболевания и индивидуальной реакции пациента.; Начальная доза составляет 2 мг 1 раз/сут. При необходимости возможно увеличение дозы до 4 мг/сут и далее - до 6 мг/сут после истечения времени, которое требуется для достижения полного терапевтического эффекта. Обычно в клинической практике этот период составляет 3-4 недели, если только состояние пациента не требует более быстрого увеличения дозы.; Лаципил следует принимать в одно и то же время дня, предпочтительно утром, независимо от приема пищи.; Пациентам с нарушениями функции печени коррекции дозы Лаципила не требуется.; Пациентам с нарушениями функции почек, а также лицам пожилого возраста коррекции дозы Лаципила не требуется.

Противопоказания

— аортальный стеноз; — детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлена); — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные по безопасности клинического применения Лаципила при беременности отсутствуют.; Применение Лаципила при беременности и в период лактации возможно только в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или новорожденного.; В экспериментальных исследованиях на лабораторных животных показано, что лацидипин или его метаболиты выделяются с грудным молоком.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно развитие эффектов, связанных с расширением периферических сосудов, в т.ч. головная боль, приливы, периферические отеки, головокружение, сердцебиение (эти эффекты обычно носят преходящий характер и, как правило, исчезают при продолжении приема Лаципила в прежней дозе); редко - обострение стенокардии, особенно сразу после начала лечения (что более вероятно у пациентов с выраженными клиническими проявлениями ИБС).; Со стороны пищеварительной системы: редко - функциональные расстройства желудка, тошнота, гиперплазия десен; очень редко - обратимое повышение уровня ЩФ.; Со стороны мочевыделительной системы: редко - полиурия.; Дерматологические реакции: редко - кожная сыпь (эритема), зуд.; Прочие: редко - общая слабость.

Передозировка

В медицинской литературе не описано случаев передозировки Лаципила.; Симптомы: по-видимому, наиболее вероятны артериальная гипотензия и тахикардия (связанные с длительным расширением периферических сосудов). Теоретически Лаципил способен вызвать брадикардию и замедление AV-проводимости.; Лечение: специфического антидота Лаципила не существует. Рекомендуется проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение Лаципила и других антигипертензивных препаратов, например диуретиков, бета-адреноблокаторов или ингибиторов АПФ, может вызывать аддитивный гипотензивный эффект.; При одновременном применении Лаципила с другими широко применяемыми антигипертензивными препаратами, дигоксином, толбутамидом и варфарином специфического взаимодействия не отмечено.; Антигипертензивное действие Лаципила ослабляют НПВС (задержка натрия и блокирование синтеза простагландинов почками) и эстрогены (задержка натрия).; Концентрация лацидипина в плазме крови может повышаться при одновременном приеме циметидина.; У пациентов после трансплантации почки, получавших циклоспорин, Лаципил устраняет вызванное приемом циклоспорина снижение почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации.

Особые указания

Лацинил не влияет на автоматизм синоатриального узла и не замедляет проведение возбуждения через AV-узел.; Учитывая теоретическую возможность влияния блокаторов кальциевых каналов на функцию синоатриального и AV-узлов, Лацинил необходимо с осторожностью применять у пациентов с нарушением активности этих водителей ритма.; Лацидипин (как и другие блокаторы кальциевых каналов из группы дигидропиридина) следует применять с осторожностью у пациентов с врожденным или приобретенным (подтвержденным документально) удлинением интервала QT. Лацинил следует с осторожностью назначать одновременно с препаратами, способными вызывать удлинение интервала QT, такими как антиаритмические препараты I и III классов, трициклические антидепрессанты, некоторые нейролептики, антибиотики (эритромицин) и некоторые блокаторы гистаминовых H1-рецепторов (терфенадин).; Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с низкими значениями сердечного выброса, при нестабильной стенокардии и после недавно перенесенного инфаркта миокарда.; С осторожностью применяют Лацинил у пациентов с печеночной недостаточностью, поскольку у данной категории больных гипотензивный эффект препарата может быть более выраженным.; Лацинил не нарушает толерантность к глюкозе, не снижает эффективность противодиабетической терапии.; В период лечения необходимо проводить стандартное наблюдение за функциональным состоянием миокарда и уровнем АД.; Как и другие препараты дигидропиридинового ряда, Лацинил нельзя запивать грейпфрутовым соком, поскольку это может снизить его биодоступность.; Использование в педиатрии; Клинический опыт применения Лацинила в педиатрии отсутствует, поэтому не рекомендуется применять препарат у пациентов младше 18 лет.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Данные о влиянии Лацинила на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствуют.