Инструкция по применению
Ладастен таблетки 50мг N50

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Адамантилбромфениламин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Адамантилбромфениламин

Состав

Адамантилбромфениламин 50 мг;Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Cmax составляет 363.3 нг/мл, Tmax составляет 2-4 ч.;T1/2 препарата - 11.21 ч.

Показания

— астенические состояния различного генеза, в т.ч. при соматических заболеваниях и после перенесенных инфекционных заболеваний; — неврастения.

Способ применения и дозы

Ладастен; принимают внутрь, независимо от приема пищи.;Разовая доза препарата - 50-100 мг; суточная доза составляет 100-200 мг в 2 приема.;Препарат не следует применять после 16 ч. Длительность курсового применения препарата составляет 2-4 недели.

Противопоказания

— беременность; — период лактации; — детский возраст до 18 лет; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата Ладастен; при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны ЦНС: могут отмечаться проявления избыточной активации и расстройства засыпания.;Прочие: аллергические реакции (при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату).

Передозировка

При значительной передозировке возможно развитие седативного эффекта.;Лечение: неспецифическая дезинтоксикационная терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Ладастен; при одновременном применении уменьшает гипнотическое действие тиопентала натрия.;При одновременном применении с производными бензодиазепина Ладастен; не ослабляет их анксиолитического эффекта.

Особые указания

При возникновении побочных эффектов со стороны ЦНС обычно не требуется отмены препарата, целесообразно уменьшить его дозу.

Условия хранения

В сухом месте