Инструкция по применению
Лаеннек ампулы 2мл 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Япония
Производитель: ДЖАПАН БИОПРОДАКТС ИНДАСТРИ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гидролизат плаценты человека
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 112 мг/2 мл

Действующее вещество

Гидролизат плаценты человека

Состав

В 2 мл препарата содержится 112 мг гидролизата плаценты человека, вода для инъекций, корректор pH (натрия гидроксид или кислота хлористоводородная). Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии следующих заболеваний: хронический рецидивирующий герпес, атопический дерматит сред нетяжелого и тяжелого течения (в том числе, осложненный). В виде монотерапии при хронических заболеваниях печени: стеато гепатитах (алкогольной, метаболической и смешанной этиологии).

Способ применения и дозы

При хроническом рецидивирующем герпесе и атопическом дерматите: внутривенное капельное введение: 10 мл (540 мг гидролизата плаценты) препарата (5 ампул) растворяют в 250 – 500 мл 5% раствора декстрозы или физиологического раствора й вводят через локтевую вену в течение 1,5-2 часов. Инъекции проводят 3 раза в неделю с интервалом в 2 дня. Курс лечения 10 инъекций. При хронических заболеваниях печени: стеатогепатитах (алкогольной, метаболической и смешанной этиологии): внутримышечно: по 2 мл в сутки (112 мг гидролизата плаценты). В зависимости от тяжести заболевания частота инъекций может быть увеличена до 2 -3 раз (до 6 мл) в сутки; внутривенное капельное введение: 10 мл (560 мг. гидролизата плаценты) препарата (5 ампул) растворяют в 250 - 500 мл 5% раствора декстрозы или физиологического раствора и вводят через локтевую вену в течение 1;5 - 2 часов. Инъекции проводят ежедневно. Курс лечения 2 - 3 недели.

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст, беременность, период лактации. С осторожностью С осторожностью следует применять препарат у пациентов, страдающих поливалентной аллергией на лекарственные препараты, а также у лиц пожилого возраста

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Отмечается у 3,7% больных. Клинически значимые нежелательные реакции. Возможны аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Другие нежелательные явления: Болезненность в месте инъекции 2,56% Аллергические реакции (покраснение, зуд кожи) 0,37% Онемение в месте инъекции 0,37% Гинекомастия (причинно-следственная связь с введением препарата не установлена) 0,37%

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки Лаеннека не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При смешивании Лаеннека с другими препаратами, являющимися сильными основаниями (pH выше 8,5), в результате фармацевтического взаимодействия его активность снижается. Сведения о каких-либо других клинически значимых взаимодействиях Лаеннека до настоящего времени отсутствуют.

Особые указания

Применение препарата у детей Исследования по безопасности применения Лаеннека у недоношенных детей, новорожденных г рудных и несовершеннолетних детей не проводились. Применение у детей не рекомендуется. Применение препарата у пожилых Согласно имеющимся в настоящее время данным пожилой возраст не является противопоказанием для назначения Лаеннека. Тем не менее, поскольку физиологические функции у пожилых людей ухудшаются, применение препарата должно проводиться под тщательным контролем. Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами не установлено.

Условия хранения

При температуре от 18 до 25°C в защищенном от света месте. Хранить в местах, недоступных для детей.